

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l'ordre qu'on voudra. On peut admettre des résultats des questions précédentes en le signalant. Enfin, les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Merci de soigner la rédaction. LES CALCULATRICES NE SONT PAS AUTORISÉES.

Exercice 1 – Intégrales indéfinies

Déterminer les primitives suivantes :

1. $\int e^x (\sin(x) + \sqrt{3} \cos(x)) dx$.
2. $\int \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2} dx$. On pourra poser $x = \tan(t)$ et remarquer qu'alors $\sqrt{1 + x^2} = \frac{1}{\cos(t)}$.
3. $\int \frac{dx}{(2 + \cos(x))(3 + \cos(x))}$. On pourra poser $t = \tan(x/2)$.
4. $\int \frac{7x^3 + 27x^2 + 41x + 25}{(x^3 - x)(x^2 + 4x + 5)^2} dx$.
 - (a) Donner la forme générale de la décomposition en éléments simples de l'intégrand.
 - (b) Calculer les coefficients des termes correspondants aux racines réelles du dénominateur.
 - (c) Calculer la différence entre l'intégrand et les éléments calculés à la question précédente, en simplifiant au maximum. On cherchera un dénominateur de la forme $((x + a)^2 + b)^2$.
 - (d) Conclure.

Exercice 2 – Équations différentielles

Intégrer les équations différentielles suivantes :

1. $y' - \frac{y}{1 - x^2} = 1 + x$, avec $y(0) = 0$.
2. $y^{(3)} + 2y'' + 2y' + y = x$, avec $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$. On pourra chercher une solution particulière simple.
3. $y'' - 2y' - 3y = x(1 + e^{3x})$.
 - (a) Résoudre l'équation homogène.
 - (b) Pour y_1 et y_2 deux solutions de l'équation homogène, chercher y sous la forme $u_1 y_1 + u_2 y_2$ avec $u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0$.

Exercice 3 – Courbes

1. Trouver les courbes telles que, si l'on désigne par N le point d'intersection avec l'axe des abscisses de la normale en M à l'une des courbes, on ait $OM = 2ON$.
2. (Question difficile) Déterminer la courbe telle que le segment de la tangente à la courbe compris entre ses intersections avec les axes de coordonnées est constante égale à ℓ . On pourra montrer que l'équation différentielle satisfaite par la courbe peut s'écrire $y = xp + \phi(p)$, avec $p = y'$, puis chercher une solution vérifiant $x = -\phi'(p)$.

Exercice 1 – Intégrales indéfinies

1. On a $\int e^{(1+i)x} dx = \frac{e^{(1+i)x}}{1+i} = \frac{1-i}{2} e^{(1+i)x}$ et donc

$$\int e^x \cos(x) = \operatorname{Re} \left(\int e^{(1+i)x} dx \right) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(e^{(1+i)x} \right) + \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(e^{(1+i)x} \right) = \frac{\cos(x) + \sin(x)}{2} e^x$$

et

$$\int e^x \sin(x) = \operatorname{Im} \left(\int e^{(1+i)x} dx \right) = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(e^{(1+i)x} \right) - \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(e^{(1+i)x} \right) = \frac{-\cos(x) + \sin(x)}{2} e^x.$$

D'où

$$\int e^x \left(\sin(x) + \sqrt{3} \cos(x) \right) dx = e^x \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2} \cos(x) + \frac{\sqrt{3}+1}{2} \sin(x) \right) + C.$$

2. Le plus simple est d'intégrer par parties. On intègre dx/x^2 et il vient

$$\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = -\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + \operatorname{argsh}(x).$$

En suivant l'indication de l'énoncé, il vient : $x = \tan(t)$ pour t dans $] -\pi; \pi[$ et donc $\cos^2(t) = 1/(1 + \tan^2(t)) = 1/(1 + x^2)$. Puisque cosinus est positif sur $] -\pi; \pi[$, il en résulte $\cos(t) = 1/\sqrt{x^2+1}$ ou encore $\sqrt{x^2+1} = 1/\cos(t)$. D'où

$$\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2} dx = \int \frac{1}{\cos(t)} \frac{1}{\tan^2(t)} \frac{dt}{\cos^2(t)} = \int \frac{dt}{\sin^2(t) \cos(t)}.$$

On pose maintenant $z = \sin(t)$, de sorte que $dz = \cos(t)dt$ et $\sin^2(t) \cos^2(t) = z^2(1-z^2)$. Il vient

$$\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2} dx = \int \frac{dz}{z^2(1-z^2)}.$$

On écrit $\frac{1}{z^2(1-z^2)} = \frac{a}{z} + \frac{b}{z^2} + \frac{c}{z-1} + \frac{d}{1+z}$ avec a, b, c et d réels. En multipliant par $z-1$ et en faisant $z=1$, il vient $c = -1/2$. De même on trouve $d = 1/2$ et $b = 1$. On constate alors

$$\frac{1}{z^2} - \frac{1}{2(z-1)} + \frac{1}{2(1+z)} = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^2-1} = \frac{1}{z^2(1-z^2)}$$

et donc $a = 0$. Il en résulte

$$\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2} dx = -\frac{1}{z} + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+z}{1-z} \right).$$

Or $z = \sin(t) = \tan(t) \cos(t) = x/\sqrt{x^2+1}$ et $(1+z)/(1-z) = (1+z)^2/(1-z^2) = (1 + \sin(t))^2/\cos^2(t) = (\tan(t) + 1/\cos(t))^2 = (x + \sqrt{x^2+1})^2$. De plus $x + \sqrt{x^2+1}$ est positif, puisque $x^2 < x^2+1$. Il vient

$$\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + \ln \left(\left| x + \sqrt{x^2+1} \right| \right)$$

i.e.

$$\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + \ln(x + \sqrt{x^2+1}) + C.$$

3. On pose $t = \tan(x/2)$ de sorte que $\cos(x) = (1-t^2)/(1+t^2)$ et $dt = \frac{1}{2}(1+t^2)dx$. Il vient

$$\int \frac{dx}{(2+\cos(x))(3+\cos(x))} = \int \frac{1}{(2+\frac{1-t^2}{1+t^2})(3+\frac{1-t^2}{1+t^2})} \frac{2dt}{1+t^2} = \int \frac{1+t^2}{(3+t^2)(2+t^2)} dt.$$

On écrit $\frac{1+t^2}{(3+t^2)(2+t^2)} = \frac{a+bt}{3+t^2} + \frac{c+dt}{2+t^2}$ avec a, b, c et d réels. En remettant tout au même dénominateur, il vient

$$1+t^2 = (a+bt)(2+t^2) + (c+dt)(3+t^2) = (2a+3c) + (2b+3c)t + (a+c)t^2 + (b+d)t^3$$

et donc $b = d = 0$ et $a = 2$ et $c = -1$. D'où

$$\int \frac{dx}{(2+\cos(x))(3+\cos(x))} = 2 \int \frac{dt}{3+t^2} - \int \frac{dt}{2+t^2}$$

et

$$\int \frac{dx}{(2+\cos(x))(3+\cos(x))} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{2}}\right) + C.$$

4. (a) Puisque $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ et que $x^2 + 4x + 5 = (x+2)^2 + 1$ n'a pas de racines réelles, il existe d'unique réels a, b, c, d, d' et D, D' tels que

$$\frac{7x^3 + 27x^2 + 41x + 25}{(x^3 - x)(x^2 + 4x + 5)^2} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+1} + \frac{dx + d'}{x^2 + 4x + 5} + \frac{Dx + D'}{(x^2 + 4x + 5)^2}.$$

(b) En multipliant par x et en faisant $x = 0$, il vient $a = 25/(-25) = -1$. De même $b = 100/200 = 1/2$ et $c = 4/8 = 1/2$.

(c) On a $-\frac{1}{x} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right) = -\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2-1} = \frac{1}{x(x^2-1)}$ et donc

$$\begin{aligned} & \frac{7x^3 + 27x^2 + 41x + 25}{(x^3 - x)(x^2 + 4x + 5)^2} + \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right) \\ &= \frac{7x^3 + 27x^2 + 41x + 25 - (x^2 + 4x + 5)^2}{(x^3 - x)(x^2 + 4x + 5)^2} \\ &= \frac{7x^3 + 27x^2 + 41x + 25 - (x^4 + 8x^3 + 26x^2 + 40x + 25)}{(x^3 - x)(x^2 + 4x + 5)^2} \\ &= \frac{-x^4 - x^3 + x^2 + x}{(x^3 - x)(x^2 + 4x + 5)^2} \\ &= \frac{-x^3 - x^2 + x + 1}{(x^2 - 1)(x^2 + 4x + 5)^2} \\ &= \frac{-x - 1}{(x^2 + 4x + 5)^2} \\ &= \frac{-x - 1}{((x+2)^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

La différence entre l'intégrand et les éléments calculés à la question précédente est égale à $\frac{-x-1}{((x+2)^2+1)^2}$.

- (d) Pour calculer une primitive de la fraction rationnelle trouvée précédemment, on pose $z = x + 2$ et on obtient

$$\int \frac{-x-1}{((x+2)^2+1)^2} dx = - \int \frac{z-1}{(z^2+1)^2} dz.$$

De plus $z-1 = \frac{1}{2}(2z) - 1$, donc

$$- \int \frac{z-1}{(z^2+1)^2} dz = \frac{1}{2(z^2+1)} + \int \frac{dz}{(z^2+1)^2}.$$

Or, par intégration par parties,

$$\begin{aligned} \arctan(z) &= \int \frac{dz}{z^2+1} \\ &= \frac{z}{z^2+1} + \int \frac{2z^2}{(z^2+1)^2} dz \\ &= \frac{z}{z^2+1} + 2 \int \frac{z^2+1}{(z^2+1)^2} dz - 2 \int \frac{dz}{(z^2+1)^2} \\ &= \frac{z}{z^2+1} + 2 \arctan(z) - 2 \int \frac{dz}{(z^2+1)^2} \end{aligned}$$

et donc

$$\int \frac{dz}{(z^2+1)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z^2+1} + \arctan(z) \right)$$

et

$$\int \frac{-x-1}{((x+2)^2+1)^2} dx = \frac{z+1}{2(z^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan(z) = \frac{x+3}{2(x^2+4x+5)} + \frac{1}{2} \arctan(x+2).$$

Comme

$$\int \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x+1)} \right) dx = -\ln(|x|) + \frac{1}{2} \ln(|x^2-1|),$$

il vient

$$\int \frac{7x^3 + 27x^2 + 41x + 25}{(x^3-x)(x^2+4x+5)^2} dx = \ln \left| \frac{x^2-1}{x} \right| + \frac{x+3}{2(x^2+4x+5)} + \frac{1}{2} \arctan(x+2) + C.$$

Exercice 2 – Équations différentielles

- Puisque l'on cherche une solution valant 0 en 0, on étudie l'équation sur l'intervalle $] -1; +1[$, qui est le plus grand intervalle contenant 0 et sur lequel les fonctions intervenant dans l'équation sont définies. On a

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \int \frac{dx}{2(1-x)} + \int \frac{dx}{2(1+x)} = \ln \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right) + C$$

et donc l'équation homogène $y' - \frac{y}{1-x^2} = 0$ admet pour solutions les fonctions de la forme $C\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$. On cherche donc une solution particulière de l'équation $y' - \frac{y}{1-x^2} = 1+x$ sous la forme $u(x)\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ avec $u'(x) = (1+x)\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, ou encore $u'(x) = \sqrt{1-x^2}$. On exige de plus $u(0) = 0$. On a, en intégrant par parties,

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = x\sqrt{1-x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

et, comme $x^2 = x^2 - 1 + 1$, il vient

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = x\sqrt{1-x^2} - \int \sqrt{1-x^2} dx + \arcsin(x)$$

et donc $\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin(x)) + C$. Si l'on impose $u(0) = 0$, la constante d'intégration est nulle et on en déduit

La solution de l'équation différentielle $y' - \frac{y}{1-x^2} = 1+x$, vérifiant $y(0) = 0$, est la fonction définie sur $] -1; +1[$ par $y(x) = \frac{x(1+x)}{2} + \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \frac{\arcsin(x)}{2}$.

2. L'équation caractéristique associée à l'équation différentielle homogène $y^{(3)} + 2y'' + 2y' + y = 0$ est $X^3 + 2X^2 + 2X + 1 = 0$. Une racine évidente est -1 et on a $X^3 + 2X^2 + 2X + 1 = (X+1)(X^2 + X + 1)$. Il en résulte que les solutions de l'équation homogène sont combinaisons linéaires d'exponentielles d'exposants -1 , $j = (-1 + i\sqrt{3})/2$ et $j^2 = (-1 - i\sqrt{3})/2$ et donc de la forme

$$y(x) = ae^{-x} + \left(b \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + c \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right) e^{-x/2},$$

avec a , b et c réels.

Par ailleurs une solution particulière de l'équation $y^{(3)} + 2y'' + 2y' + y = x$ est $y_0(x) = x - 2$. Il vient

$$\begin{cases} y_0(0) + y(0) = 0 \\ y_0'(0) + y'(0) = 0 \\ y_0''(0) + y''(0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b - 2 = 0 \\ -a - \frac{b}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}c + 1 = 0 \\ a - \frac{3}{4}b + \frac{b}{4} - \frac{\sqrt{3}}{2}c = 0 \end{cases}$$

et donc $b = 1$, $a = 1$ et $c = 1/\sqrt{3}$, i.e.

La solution de l'équation différentielle $y^{(3)} + 2y'' + 2y' + y = x$, vérifiant $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$ est $x - 2 + e^{-x} + e^{-x/2} \left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right)$.

3. (a) L'équation homogène $y'' - 2y' - 3y = 0$ admet pour équation caractéristique $X^2 - 2X - 3$ dont les racines sont -1 et 3 . Il en résulte

Les solutions de l'équation homogène $y'' - 2y' - 3y = 0$ sont de la forme $y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x}$ avec c_1 et c_2 réels.

- (b) On cherche une solution $y(x)$ de l'équation $y'' - 2y' - 3y = 0$ sous la forme $u_1(x)e^{3x} + u_2(x)e^{-x}$ avec $u_1'(x)e^{3x} + u_2'(x)e^{-x} = 0$. On a donc $y'(x) = 3u_1(x)e^{3x} - u_2(x)e^{-x}$ et

$$y''(x) - 2y'(x) - 3y(x) = (9 - 2 \cdot 3 - 3)u_1(x)e^{3x} + 3u_1'(x)e^{3x} + (1 - 2 \cdot (-1) - 3)u_2(x)e^{-x} - u_2'(x)e^{-x}.$$

D'où

$$3u_1'(x)e^{3x} - u_2'(x)e^{-x} = x(1 + e^{3x}) \quad \& \quad u_1'(x)e^{3x} + u_2'(x)e^{-x} = 0.$$

Il vient $u_1'(x)e^{3x} = x(1 + e^{3x})/4$ et $u_2'(x)e^{-x} = -x(1 + e^{3x})/4$. Or

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = (x - 1)e^x + C.$$

Et donc, par changement de variable $u = -3x$ ou $v = 4x$, il vient $\int xe^{-3x} dx = \frac{1}{9}(-3x - 1)e^{-3x} + C$ et $\int xe^{4x} dx = \frac{1}{16}(4x - 1)e^{4x} + C$, et on peut donc choisir $u_1(x) = \frac{1}{36}(-3x - 1)e^{-3x} + \frac{x^2}{8}$ et $u_2(x) = \frac{1}{4}(1 - x)e^x - \frac{1}{64}(4x - 1)e^{4x}$, ce qui fournit

$$y(x) = -\frac{3x + 1}{36} + \frac{x^2}{8}e^{3x} + \frac{1 - x}{4} - \frac{4x - 1}{64}e^{3x}$$

comme solution particulière de $y'' - 2y' - 3y = x(1 + e^{3x})$. Ou encore $y(x) = \frac{2 - 3x}{9} - \frac{2x^2 - x}{16}e^{3x} + \frac{1}{64}e^{3x}$.

Les solutions de l'équation $y'' - 2y' - 3y = x(1 + e^{3x})$ sont de la forme $y(x) = \frac{2 - 3x}{9} - \frac{2x^2 - x}{16}e^{3x} + c_1e^{3x} + c_2e^{-x}$ avec c_1 et c_2 réels.

Exercice 3 – Courbes

- Soit $y(x)$ la courbe recherchée et $y_0 = y(x_0)$ et $y'_0 = y'(x_0)$ les valeurs de $y(x)$ et $y'(x)$ en un point x_0 . La tangente en $(x_0; y_0)$ à la courbe $y(x)$ admet pour équation $y - y_0 = y'_0(x - x_0)$ et donc la normale admet $(x - x_0) + y'_0(y - y_0) = 0$ comme équation. Son intersection avec l'axe des abscisses est donc le point $(x_0 + y_0 y'_0; 0)$. La courbe vérifie donc $x^2 + y^2(x) = 4(x + y(x)y'(x))^2 = (2x + 2y(x)y'(x))^2$. Autrement dit la fonction $z(x) = x^2 + y^2(x)$ vérifie $z = (z')^2$, soit $z(x) = (x - a)^2/4$ pour un certain réel a , et donc il s'agit donc d'une ellipse de foyer l'origine, de directrice d'équation $x = a$ et d'excentricité $1/2$.

Les courbes telles que, si l'on désigne par N le point d'intersection avec l'axe des abscisses de la normale en M à l'une des courbes, on ait $OM = 2ON$, sont les ellipses de foyer l'origine, d'excentricité $1/2$ et de directrice une droite verticale.

- Soit $y(x)$ la courbe recherchée et $y_0 = y(x_0)$ et $y'_0 = y'(x_0)$ les valeurs de $y(x)$ et $y'(x)$ en un point x_0 . La tangente en $M = (x_0; y_0)$ à la courbe $y(x)$ admet pour équation $y - y_0 = y'_0(x - x_0)$ et donc les points d'intersection de la tangente avec les axes de coordonnées sont les points $A = (0; y_0 - x_0 y'_0)$ et $B = (x_0 - y_0/y'_0; 0)$ (puisque ces points sont supposés exister on a $y'_0 \neq 0$).

Par hypothèse $AB = \ell$ et d'après le théorème de Thalès, on a $AM/AB = AC/AO$ où $C = (0, y_0)$. Il vient, en se restreignant au quadrant $x > 0$ et $y > 0$,

$$\frac{y_0 - x_0 y'_0}{x_0 y'_0} = \frac{\ell}{\sqrt{x_0^2 + x_0^2 (y'_0)^2}}$$

ou encore $y_0 - x_0 y'_0 = \ell y'_0 / \sqrt{1 + (y'_0)^2}$, i.e. la courbe satisfait à l'équation différentielle $y = xp + \phi(p)$, avec $p = y'$ et $\phi(p) = \ell p / \sqrt{1 + p^2}$.

Si on suppose $x = -\phi'(p)$, on a $-x = \ell / \sqrt{1 + p^2} - \ell p^2 / (1 + p^2)^{3/2}$ ou encore $x = -\ell / (1 + p^2)^{3/2}$, soit $xp = -\phi(p) / (1 + p^2)$ ou $\phi(p) = -(p^3 + p)x$. D'où $y = xp - (p + p^3)x = -p^3 x$, soit $y' = -\sqrt[3]{y/x}$. C'est une équation à variables séparables : $dy/y^{1/3} + dx/x^{1/3} = 0$. Elle s'intègre en $y^{2/3} + x^{2/3} = k$, pour un certain réel positif k . Il vient $A = (0; y + x^{2/3}y^{1/3}) = (0; ky^{1/3})$ et $B = (x + y^{2/3}x^{1/3}; 0) = (kx^{1/3}; 0)$, de sorte que $AB^2 = k^3$ et donc $k = \ell^{2/3}$.

La courbe, telle que le segment de la tangente à la courbe compris entre ses intersections avec les axes de coordonnées est constante égale à ℓ , est l'astroïde d'équation $x^{2/3} + y^{2/3} = \ell^{2/3}$ ou encore $(x(t), y(t)) = (\ell \cos^3(t), \ell \sin^3(t))$.