

**Exercice 1** *Base*

Dans l'espace  $\mathbf{R}^4$ , on donne les vecteurs  $x_1 = (1, 1, 2, 1)$ ,  $x_2 = (1, -1, 0, 1)$ ,  $x_3 = (0, 0, -1, 1)$ ,  $x_4 = (1, 2, 2, 0)$  et  $x = (1, 1, 1, 1)$ .

1. Montrer que les quatre vecteurs  $(x_i)_{1 \leq i \leq 4}$  forment une base de  $\mathbf{R}^4$ .
2. Déterminer les coordonnées de  $x$  dans la base  $(x_i)_{1 \leq i \leq 4}$ .

**Exercice 2** *Sous-espace engendré*

Dans un espace vectoriel  $E$  sur le corps des complexes, on donne trois éléments  $a$ ,  $b$  et  $c$  et on pose  $u = b + c$ ,  $v = c + a$  et  $w = a + b$ .

1. Montrer que les sous-espaces vectoriels engendrés par  $a$ ,  $b$  et  $c$  d'une part et  $u$ ,  $v$  et  $w$  de l'autre sont identiques.
2. Montrer que les vecteurs  $u$ ,  $v$  et  $w$  sont indépendants (i.e forment une famille libre) si et seulement si  $a$ ,  $b$  et  $c$  le sont.

**Exercice 3** *Supplémentaire*

On se place dans l'espace vectoriel  $E$  des fonctions continues de  $[0; 1]$  dans  $\mathbf{R}$ . Soit  $F$  l'ensemble des fonctions dont l'intégrale est nulle.

1. Montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .
2. En donner un supplémentaire.

**Exercice 4** *Supplémentaire (bis)*

On se place dans l'espace vectoriel  $E_n$  des polynômes à coefficients réels de degré inférieur à  $n$ . Soit  $A$  un polynôme non constant, dans  $E_n$ .

1. Montrer que l'ensemble  $F$  des polynômes de  $E_n$  divisibles par  $A$ , i.e. de la forme  $AB$  pour un certain  $B$  dans  $E_n$ , est un sous-espace vectoriel de  $E_n$ .
2. En déterminer un supplémentaire et donner la dimension de  $F$ .

**Exercice 5** *Fonctions trigonométriques*

On se place dans l'espace vectoriel  $E$  des fonctions continues de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{R}$ .

1. La famille de fonctions  $f_n$  définies par  $f_n(t) = \sin^n(t)$  est-elle libre ?
2. Soit  $E_n$  l'ensemble des polynômes trigonométriques de degré inférieur à  $n$ , i.e. des fonctions de la forme  $x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt))$  avec des coefficients  $a_i$  et  $b_j$  réels. Montrer que  $E_n$  est un espace vectoriel.
3. Montrer, en utilisant des résultats sur les équations différentielles, que si  $x$  est la fonction nulle, alors tous les coefficients  $a_i$  et  $b_j$  sont nuls.
4. Donner la dimension de  $E_n$  ainsi qu'une base.
5. On désigne par  $u$  l'application de  $E$  dans  $E$  qui à  $x$  associe  $y = u(x)$  définie par  $y(t) = x(t + \pi/4)$ . Montrer que  $u$  est une application linéaire.
6. Montrer que  $u^8$  est l'application identique.
7. Déterminer le noyau et l'image de  $u$ , i.e. l'ensemble des applications  $x$  telles que  $u(x) = 0$  et les  $y$  de la forme  $u(x)$ .

**Exercice 6** *Polynômes de Newton*

On se place dans l'espace vectoriel  $E_n$  des polynômes à coefficients complexes de degré inférieur à  $n$ . On note  $U_0 = 1$  et, pour  $1 \leq k \leq n$ ,  $U_k(X) = X(X-1) \cdots (X-k+1)$ .

1. Montrer que les polynômes  $U_k$  forment une base de  $E_n$ .
2. Montrer qu'il existe une application linéaire et une seule de  $E_n$  dans lui-même qui vérifie les  $n+1$  conditions  $\varphi(X^k) = U_k$ . Montrer qu'elle est bijective.
3. On définit une application  $\delta$  de  $E_n$  dans lui-même par  $\delta(P)(X) = P(X+1) - P(X)$ . Montrer que  $\delta$  est linéaire et déterminer les polynômes  $\delta(U_k)$ .
4. Déterminer le noyau et l'image de  $\delta$ .
5. Montre que, pour tout polynôme  $R$ , l'équation en  $n$  et  $P \in E_n : P(0) = 0$  et  $\delta(P) = R$  admet une unique solution en  $P$ , indépendante de  $n$  pour peu qu'il soit assez grand.
6. Déterminer  $P$  pour  $R(X) = X^3 - 5X^2 + X + 1$ .
7. Déterminer l'application  $d = \varphi^{-1} \circ \delta \circ \varphi$ .

**Exercice 7** *Corps des complexes*

On se place dans l'espace vectoriel  $E$  des matrices  $2 \times 2$  à coefficients réels, i.e.  $E = \mathcal{M}_{2,2}(\mathbf{R})$ .

1. Soit  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  dans  $E$ , calculer  $A^2$  et montrer qu'il existe des réels  $\alpha$  et  $\beta$  tels que  $A^2 = \alpha A + \beta I_2$ .
2. Dans quel cas ces coefficients  $\alpha$  et  $\beta$  ne sont pas uniques ?
3. On note  $F$  le sous-espace vectoriel engendré par  $A$  et  $I_2$ . Quelle est sa dimension ?
4. Montrer que si  $B$  appartient à  $F$  et est inversible, son inverse appartient à  $F$ .
5. Déterminer quand  $F$  admet une structure de corps.
6. Lorsque  $a = d = 0$  et  $b = -c = 1$ , montrer que ce corps est isomorphe au corps des complexes.

**Exercice 8** *Équations différentielles*

On se place dans l'espace vectoriel  $E$  des fonctions deux fois dérivables de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{C}$ .

1. Montrer que l'ensemble  $F$  des solutions de l'équation différentielle  $y'' + ay' + by = 0$ , avec  $a$  et  $b$  dans  $\mathbf{C}$  fixés, est un sous-espace vectoriel de  $E$ . Donner sa dimension.
2. Montrer que l'application  $\delta$  qui à une fonction associe sa dérivée est bien définie de  $F$  dans lui-même et est une application linéaire.
3. Montrer que  $\delta$  n'est pas proportionnelle à l'application identique,  $Id$ .
4. Montrer que  $\delta$  est bijective sauf pour certaines valeurs de  $a$  et  $b$  que l'on explicitera.
5. Montrer  $\delta \circ \delta + a \cdot \delta + b \cdot Id = 0$ , puis qu'il existe  $\alpha$  et  $\beta$  complexes tels que  $(\delta - \alpha \cdot Id) \circ (\delta - \beta \cdot Id) = 0$ .
6. Montrer que les applications  $\delta - \lambda \cdot Id$  ne sont pas inversibles lorsque  $\lambda$  vaut  $\alpha$  ou  $\beta$ . Déterminer alors image et noyau de ces applications.
7. Montrer que dans le cas contraire, ces applications sont inversibles.