

Exercice 1 *Un peu de pratique*

1. Calculer

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 9 & 16 & 25 & 36 \\ 16 & 25 & 36 & 49 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

2. Montrer que le déterminant de la matrice de permutation associée à σ est égal à sa signature.
3. Calculer le déterminant des endomorphismes suivants :
- $E = \mathbf{C}_n[X]$, $u : P(X) \mapsto P(X+1)$ et $v = u - Id$.
 - $E = \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$, $u(M) = {}^t M$ et $v(M) = AM$ pour un certain A dans E .

Exercice 2 *Formules de Cramer*

On s'intéresse au système linéaire $AX = B$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbf{K})$.

1. Montrer que ce système a une unique solution si et seulement si $\det(A) \neq 0$.
2. On suppose $n = 2$ et $\det(A) \neq 0$, montrer que $X = (x_1, x_2)$ est solution du système si et seulement si $x_i = \det(A_i) / \det(A)$ où A_i est obtenue en remplaçant la i^{e} colonne de A par B .
3. Montrer que ce résultat est encore vrai pour $n = 3$ et $\det(A) \neq 0$.
4. Montrer que ce résultat est vrai pour tout n lorsque $\det(A) \neq 0$.

Exercice 3 *Anneau de matrices*

On se place dans l'anneau des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans \mathbf{K} . On dit que A est nilpotente s'il existe un exposant p tel que $A^p = 0$. On dit que A est unipotente si $A - Id$ est nilpotente.

1. Montrer que si A est nilpotente, $I - A$ est inversible et donner son inverse.
2. Montrer que si A et B sont nilpotentes et commutent (i.e. $AB = BA$), alors $A + B$ et AB sont nilpotentes. L'hypothèse de commutation est-elle nécessaire ?
3. Montrer que si A est nilpotente, l'application ad_A définie par $ad_A(B) = AB - BA$ est nilpotente en tant qu'endomorphisme.

Exercice 4 *Identité de Jacobi*

On se place dans l'anneau des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans \mathbf{K} . On note $[A, B] = AB - BA$.

1. Montrer l'identité de Jacobi : $[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$.
2. Soit H, X et Y tels que $[H, X] = 2X$, $[H, Y] = -2Y$ et $[X, Y] = H$. Montrer que, pour tout entier naturel p , $[H, X^p] = 2pX^p$ et $[H, Y^p] = -2pY^p$.
3. Montrer que $4XY + H^2 - 2H$ commute à H, X et Y .
4. En déduire que le plus petit anneau contenant H, X et Y est formé des matrices sommes de matrices de la forme $mX^i Y^j H^k$ avec $m \in \mathbf{Z}$ et i, j, k entiers naturels.

Exercice 5 *Isomorphisme de groupes*

1. Montrer que le groupe $(\mathbf{R}, +)$ est isomorphe au groupe (\mathbf{R}, \star) , avec $x \star y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$.
2. Montrer que l'on définit bien un groupe, dit groupe de Klein (ou Vierergruppe) et noté V_4 , en posant $V_4 = \{e, x, y, z\}$ et e est neutre, x, y, z sont de carré e et le produit de deux éléments distincts de e est le troisième tel élément. Montrer que \mathfrak{S}_4 contient un sous-groupe isomorphe à V_4 . Quelle est la signature des éléments de ce sous-groupe ?