

Exercice 1 *Exercices de colle*

1. Soit u_n tendant vers ℓ et v_n tendant vers ℓ' , avec $\ell < \ell'$. Montrer que $u_n < v_n$ à partir d'un certain rang.
2. Montrer qu'une suite à valeurs entières converge si et seulement si elle est stationnaire.
3. Soit (u_n) une suite bornée. Étudier la monotonie de $v_n = \sup_{p \geq n} u_p$ et $w_n = \inf_{p \geq n} u_p$.
4. Soit (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que $(u_n + v_n)$ et $(u_n - v_n)$ convergent. Montrer que (u_n) et (v_n) convergent.
5. Soit (x_n) et (y_n) deux suites convergentes. Étudier $\max(u_n, v_n)$ et $\min(u_n, v_n)$.
6. Soit (u_n) une suite complexe telle que (u_n^2) et (u_n^3) convergent. Montrer que (u_n) converge. L'hypothèse " (u_n^2) converge" est-elle suffisante pour conclure que (u_n) converge ?
7. Soit $A = \{(-1)^n + \frac{1}{n+1} \mid n \in \mathbf{N}\}$. A est-il borné ? Étudier ses bornes supérieures et inférieures.
8. Soit a et b deux réels strictement positifs et $E = \{(-1)^n a + \frac{b}{n}, n \in \mathbf{N}^*\}$. Est-il minoré, majoré ? Déterminer ses bornes inférieure et supérieure si elles existent.
9. Calculer les bornes supérieure et inférieure, si elles existent, de $E = \left\{ \frac{n+m+1}{2m+n+3} \mid (n, m) \in \mathbf{N}^2 \right\}$.
10. Soit A une partie de \mathbf{R} et $a \notin A$ vérifiant $a = \sup A$. Montrer $\forall \varepsilon > 0, \exists (x, y) \in A^2, 0 < y - x < \varepsilon$.
11. Soit A une partie de \mathbf{R} , non vide et bornée et $B = \{|x - y|, (x, y) \in A^2\}$. Démontrer que B est bornée et $\sup(B) = \sup(A) - \inf(A)$.
12. Soit f de $[0; 1]$ dans lui-même, croissante. Montrer qu'elle admet un point fixe ($f(a) = a$).
13. Déterminer $\inf \left\{ (x_1 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \mid x_1, \dots, x_n > 0 \right\}$. (Indication : utilisez les inégalités entre moyennes.)
14. Montrer que les carrés de nombres rationnels sont denses dans \mathbf{R}_+ .
15. Montrer, pour x et y réels, $E(x) + E(y) \leq E(x + y) \leq E(x) + E(y) + 1$.
16. Montrer, pour x réel et $n \in \mathbf{N}^*$, $0 \leq E(nx) - nE(x) \leq n - 1$, puis $E\left(\frac{E(nx)}{n}\right) = E(x)$.
17. Pour $x \in \mathbf{R}$ et $n \in \mathbf{N}^*$ simplifier $\sum_{k=0}^{n-1} E\left(x + \frac{k}{n}\right)$.
18. Pour n et p entiers, calculer $E\left(\frac{n+p}{2}\right) + E\left(\frac{n-p+1}{2}\right)$.
19. Simplifier $E(x) + E(-x)$.
20. On pose $\{x\} = x - E(x)$. Calculer $\{x\} + \{-x\}$.
21. Montrer que $\{n\sqrt{2} - E(n\sqrt{2}) \mid n \in \mathbf{Z}\}$ est dense dans $[0; 1]$. (On note $x_n = \{n\sqrt{2}\} = n\sqrt{2} - E(n\sqrt{2})$ et on étudiera $x_{n+k} - x_n$ pour en déduire que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un terme de (x_n) inférieur à ε , puis on conclura comme pour la densité des rationnels.)
22. Montrer que, pour $n \in \mathbf{N}$, il existe un entier p tel que $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n = 2p$. En déduire que $E((2 + \sqrt{3})^n)$ est un entier impair.
23. Démontrer, pour $n \in \mathbf{N}$, $E\left(\left(\frac{3}{2}\right)^n\right) > \left(\frac{3}{2}\right)^n - 1 + \frac{1}{2^{n+1}}$.
24. Soit (u_n) une suite réelle qui ne diverge pas vers $+\infty$. Montrer que l'on peut en extraire une suite bornée.
25. On pose $E_0 = [0; 1]$, E_1 premier tiers de E_0 , E_2 deuxième tiers de E_1 ... $E_n = [a_n; b_n]$. Étude de (a_n) et (b_n) . (On pourra s'intéresser à a_{3n} .)

26. Soit u_n tel que, pour tous entiers k et n dans \mathbf{N}^* , on ait $0 \leq u_n \leq \frac{k}{n} + \frac{1}{k}$. Quelle est la limite de u_n ? (On pourra songer à une inégalité entre moyennes.)
27. Soit (u_n) une suite telle qu'il existe $k > 1$ tel que $u_{n+1} \geq ku_n$ et telle que $u_0 > 0$, étudier sa limite.
28. Soit (u_n) une suite réelle telle que, pour tous entiers naturels non nuls n et p , on ait $0 \leq u_{n+p} \leq \frac{n+p}{np}$. Montrer que u_n tend vers 0.
29. Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ une suite réelle telle que $\forall (n, p) \in (\mathbf{N}^*)^2, |u_n + u_p - u_{n+p}| \leq \frac{1}{n+p}$. Montrer que (u_n) est une suite arithmétique.
30. Soit (u_n) une suite croissante. On suppose que la suite v_n , formée des moyennes arithmétiques des $(n+1)$ premiers termes, tend vers ℓ . Étudier (u_n) sans utiliser le théorème de Césàro.
31. Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite réelle à termes strictement positifs, telle que $(\sqrt[n]{u_n})_{n \in \mathbf{N}}$ converge vers un réel ℓ . Montrer que, si $\ell < 1$, alors $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge vers 0.
32. Soit u_n telle que $\sqrt[n]{u_n}$ tend vers ℓ . Que peut-on dire si $\ell < 1, \ell > 1, \ell = 1$?
33. Trouver la limite de $\sqrt[n]{n^3 + 1}$.
34. Soit (u_n) et (v_n) deux suites telles que $0 \leq u_n \leq 1, 0 \leq v_n \leq 1$ et $u_n v_n \rightarrow 1$. Que dire de ces suites? (On pourra montrer qu'elles n'ont qu'un seul point d'accumulation.)
35. Soit (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que $u_n^2 + u_n v_n + v_n^2 \rightarrow 0$. Démontrer que (u_n) et (v_n) convergent vers 0. (On pourra majorer u_n^2 et v_n^2 par $C(u_n^2 + u_n v_n + v_n^2)$.)
36. On suppose que les suites réelles (u_n) et (v_n) vérifient $\lim(u_n^2 + u_n v_n + 2v_n^2) = 0$. Que dire de (u_n) et (v_n) ?
37. Soit (a_n) et (b_n) deux suites à termes strictement positifs telles qu'à partir d'un certain rang $a_{n+1}/a_n \leq b_{n+1}/b_n$. Démontrer que si b_n tend vers 0, alors a_n aussi et que si a_n diverge vers $+\infty$, b_n aussi.
38. Étudier la limite de la suite $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$.
39. Soit (u_n) une suite réelle telle que $\frac{u_n}{1+u_n} \rightarrow 0$. Montrer que (u_n) converge vers 0.
40. Étude de (u_n) définie par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n + u_n^2$.
41. Soit (u_n) réelle, bornée telle que $\forall n \in \mathbf{N}^*, u_n \leq \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_{n-1})$. Montrer que $(u_{n+1} - u_n)$ converge. Quelle est sa limite? Montrer que (u_n) converge.
42. Soit $x_0 > \sqrt{\alpha} > 1$ et $x_{n+1} = \frac{\alpha + x_n}{1 + x_n} = x_n + \frac{\alpha - x_n^2}{1 + x_n}$. Montrer que (x_n) converge vers $\sqrt{\alpha}$. (On pourra montrer que (x_{2n}) et (x_{2n+1}) sont adjacentes.)
43. Soit $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $b_n = a_n + \frac{1}{n \cdot n!}$. Montrer que ces suites sont adjacentes. Montrer que leur limite est irrationnelle.
44. Convergence de $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2}$.
45. Soit $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}}$. Prouver que (u_n) converge et donner sa limite.
46. Soit (u_n) une suite convergente. On suppose que la suite s_n donnée par $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$ converge vers un réel S . On pose $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k u_k$. Étudier $\lim v_n$.
47. Trouver les fonctions de \mathbf{R} dans \mathbf{R} telles que $\forall x \in \mathbf{R}, \forall r \in \mathbf{Q}, |f(x) - f(r)| \leq 7(x - r)^2$.
48. Pour $n \in \mathbf{N}$, on pose $f_n(x) = x^n(1 - x)$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0,1]} f_n(x)$.
49. Trouver a, b et c tels que $\sqrt[3]{x^3 - 6x^2} = ax + b + \frac{c}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$.
50. (Théorème de Baire) Soit U_n une famille de parties denses dans \mathbf{R} telles que, pour tout $x \in U_n, \exists \varepsilon > 0,]x - \varepsilon; x + \varepsilon[\subset U_n$. Montrer que l'intersection des U_n est non-vide. (On pourra construire une suite de segments emboîtés $[a_n; b_n]$ telle que $[a_{n+1}; b_{n+1}] \subset]a_n; b_n[$ et s'assurer que $]a_n; b_n[$ appartienne à $\cap_{k \leq n} U_k$.)

Exercice 2 Suites

1. Montrer que $u_n = \frac{3n-1}{2n+3}$ est croissante et majorée, puis qu'elle converge vers $3/2$.
2. Soit a et b deux réels strictement positifs, étudier $u_n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}$.
3. Soit a et b deux réels tels que $a < b$ et x dans $[a; b]$. Démontrer que, pour tout entier n , il existe un unique entier k_n vérifiant $0 \leq k_n \leq 2^n$ et $a + k_n \frac{b-a}{2^n} \leq x \leq a + (k_n + 1) \frac{b-a}{2^n}$. En déduire que x est limite d'une suite (u_n) d'éléments de la forme $u_n = a + k_n \frac{b-a}{2^n}$ avec $0 \leq k_n \leq 2^n$.
4. Soit (u_n) une suite telle que $\exists k < 1, |u_{n+1}| \leq k|u_n|$ à partir d'un certain rang ; étudier sa limite.

Exercice 3 Continuité

1. Trouver les points de (dis)continuité des fonctions $x \mapsto \sqrt{x - E(x)}$ et $x \mapsto E(x) + \sqrt{x - E(x)}$.
2. Soit f une fonction continue sur un intervalle et à valeurs dans $\{-1; +1\}$. Montrer que f est constante. En déduire que si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle et ne s'annulant pas, telles que $|f| = |g|$, on a $f = g$ ou $f = -g$.
3. Montrer que la fonction $1_{\mathbf{Q}}$ (fonction caractéristique de \mathbf{Q} , i.e. valant 1 sur les rationnels et 0 sur les irrationnels) est discontinue en tout point.
4. Soit f la fonction définie par $f(x) = 0$ si $x \notin \mathbf{Q}$ et $f(x) = 1/q$ si $x = p/q \in \mathbf{Q}$ (avec $p \wedge q = 1$). Montrer que f est continue exactement en les irrationnels.
5. Soit f continue de $[0; 1]$ dans lui-même telle que, pour tous x, y dans $[0; 1]$, on ait $|f(x) - f(y)| \geq |x - y|$. Montrer que f est l'une des fonctions $x \mapsto x$ ou $x \mapsto 1 - x$. (Considérer $f(0)$ et $f(1)$.)
6. Soit a un réel et f une fonction continue de \mathbf{R} dans lui-même telle que $f(1) = a$ et, pour tous réels x et y , $f(x + y) = f(x) + f(y)$. Montrer $f(n) = na$ pour n dans \mathbf{Z} , puis $f(1/q) = a/q$ pour q dans \mathbf{N}^* et enfin $f(r) = ra$ pour $r \in \mathbf{Q}$. Conclure, en utilisant la continuité de f et la densité de \mathbf{Q} dans \mathbf{R} , que f est linéaire.
7. Soit g de \mathbf{R} dans lui-même définie par $g(x) = \frac{\sin(x)}{1+x^2} - \frac{1}{x^4+1} + \frac{1}{x^6+1}$. Trouver $M > 0$ tel que, si $|x| > M$, on ait $|g(x)| \leq 1/100$ (on ne demande pas le meilleur M possible) et montrer $g(-1) < -\frac{1}{100} < \frac{1}{100} < g(1)$. En déduire que g est bornée sur \mathbf{R} et atteint ses bornes.
8. Les conclusions de l'exercice précédent sont-elles valides pour la fonction $x \mapsto 1/(1+x^2)$?
9. Soit f de $I = [a; b]$ dans lui-même. Montrer que f , en considérant $f(x) - x$, admet un point fixe (i.e. tel que $f(c) = c$). Montrer que ce point fixe est unique lorsque f est décroissante. Montrer que c'est encore le cas si f est k -lipschitzienne avec $k < 1$ (i.e. $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$). Montrer enfin que f a au plus deux points fixes lorsqu'elle est strictement convexe (i.e. $f((1-t)x + ty) < (1-t)f(x) + tf(y)$ lorsque $0 < t < 1$ et $x \neq y$).
10. Soit f de \mathbf{R}_+^* dans \mathbf{R} , continue en 1 et vérifiant $f(xy) = f(x) + f(y)$. Montrer $f(1) = 0$ et $f(1/x) = -f(x)$ pour $x > 0$. Montrer que f est continue sur \mathbf{R}_+^* (on écrira $x + h = x(1 + h/x)$). En posant $f(2) = a$, calculer $f(2^n)$, $f(2^{1/q})$ et enfin $f(2^{p/q})$ pour n, p et q entiers ($q \neq 0$). En déduire qu'il existe une constante C telle que $f(r) = C \ln(r)$ pour tout rationnel r . Conclure, enfin, que $f = C \ln$ en utilisant la continuité de f .
11. Soit A l'ensemble des fonctions continues de \mathbf{R} dans \mathbf{R} vérifiant, pour tous x et y réels, $f(\frac{x+y}{2}) = \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$. Montrer $(f, g) \in A^2 \Rightarrow f - g \in A$ et que A contient les fonctions affines. Soit f dans A et $a < b$ tels que $f(a) = f(b) = 0$; montrer que $f(a + k \frac{b-a}{2^n}) = 0$ si $0 \leq k \leq 2^n$. En conclure que f est nulle sur $[a; b]$, puis sur \mathbf{R} . Montrer $f \in A \Rightarrow f$ est affine.
12. Montrer qu'une fonction continue sur un intervalle vérifiant $f(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$ est convexe.
13. Montrer qu'une fonction continue sur \mathbf{R} et périodique est bornée.
14. Montrer qu'une fonction continue sur \mathbf{R} admettant 1 et $\sqrt{2}$ comme périodes est nécessairement constante.

Exercice 4 Suites récurrentes

1. Soit f continue de $[a; b]$ dans lui-même et $u_0 \in [a; b]$. On pose $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que si f est croissante, alors (u_n) est monotone et tend vers une limite ℓ telle que $f(\ell) = \ell$. Montrer que si f est décroissante, alors les suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones convergentes.
2. Appliquer les résultats de l'exercice précédent à $x_0 = 0$ et $x_{n+1} = \frac{x_n+1}{x_n+2}$; $y_0 = 0$ et $y_{n+1} = \cos(y_n)$; $z_0 = 1/2$ et $z_{n+1} = (1 - z_n)^2$.
3. Soit f une fonction définie sur \mathbf{R} et k -lipschitzienne pour un certain $0 < k < 1$ (i.e. $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$). Montrer que f est continue et que pour tout réel a , la suite récurrente définie par $x_0 = a$ et $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers une limite ℓ vérifiant $f(\ell) = \ell$.
4. Soit la suite définie par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = 1 + \sqrt{u_n}$. Montrer qu'elle est convergente, et déterminer sa limite.
5. Soit la suite définie par $u_0 \neq 0$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n} - 1$. Étudier sa convergence selon le signe de u_0 .
6. Soit $a > 0$ et $f(x) = 2 + a/x$ définie sur \mathbf{R}_+^* . Montrer que f a une unique point fixe. Montrer que les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones convergentes, puis que (u_n) converge.
7. On pose $u_1 = \sqrt{2}$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{u_n}}$. Montrer que (u_n) converge.
8. Soit $\alpha > 0$ et $x_1 > \sqrt{\alpha}$. On pose $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{\alpha}{x_n} \right)$. Montrer que (x_n) est monotone et tend vers $\sqrt{\alpha}$. On pose $\varepsilon_n = x_n - \sqrt{\alpha}$, montrer $\varepsilon_{n+1} = \frac{\varepsilon_n^2}{2x_n} < \frac{\varepsilon_n^2}{2\sqrt{\alpha}}$. En posant $\beta = 2\sqrt{\alpha}$, montrer $\varepsilon_n < \beta \left(\frac{\varepsilon_1}{\beta} \right)^{2^n}$ et en déduire, pour $\alpha = 3$ et $x_1 = 2$, $\varepsilon_6 < 4.10^{-32}$.
9. Remplacer la formule de récurrence précédente par $x_{n+1} = \frac{p-1}{p}x_n + \frac{\alpha}{p}x_n^{1-p}$, pour $p \in \mathbf{N}^*$ et étudier la suite ainsi obtenue.
10. (Suites homographiques) Soit la suite définie par $u_{n+1} = \frac{au_n+b}{cu_n+d}$ avec $(a, b, c, d) \in \mathbf{C}^4$. Donner les u_0 pour lesquels la suite est bien définie (on ne cherchera pas une description explicite). Montrer qu'il est équivalent de dire que $(u_{n+1}, 1)$ est un vecteur directeur de la droite image de la droite engendrée par $(u_n, 1)$ par l'application linéaire représentée par la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Montrer qu'en général il existe deux complexes α tels que $\det(A - \alpha I_2) = 0$. Dans ce cas, on les note α_1 et α_2 et on note z_1 et z_2 les complexes tels que $(z_i, 1) \in \text{Ker}(A - \alpha_i I_2)$. Montrer $(az_i + b)/(cz_i + d) = z_i$. Étudier la suite $v_n = (u_n - \alpha_1)/(u_n - \alpha_2)$ et en déduire le comportement de la suite (u_n) .
11. Étudier les cas particuliers de l'exercice précédent.

Exercice 5 Accélération de convergence

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ la suite réelle donnée par le périmètre du polygone régulier à 2^{n+1} côté inscrit dans le cercle unité et dont un des sommets est $(1, 0)$. Donner une expression de u_n et montrer qu'on peut la calculer sans connaître la valeur de π .
2. Montrer $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x$ pour tout réel x et en déduire que la suite converge vers 2π et qu'il existe θ dans $]0; 1[$ et C dans \mathbf{R}^\times tels que $u_n - 2\pi \sim C\theta^n$.
3. On pose $v_n = \frac{u_{n+1} - \theta u_n}{1 - \theta}$, pour n dans \mathbf{N}^* . Montrer que v_n converge vers 2π plus vite que u_n et préciser un équivalent de $v_n - 2\pi$.
4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite réelle convergeant vers un réel ℓ . On suppose que la suite de terme général $\frac{u_{n+1} - \ell}{u_n - \ell}$ converge vers un certain θ dans $]0; 1[$. On pose $\theta_n = \frac{u_{n+2} - u_{n+1}}{u_{n+1} - u_n}$ et $v_n = \frac{u_{n+1} - \theta_n u_n}{1 - \theta_n}$. Montrer que v_n converge vers ℓ plus vite que u_n .
5. Faire l'étude de la suite récurrente définie par $u_{n+1} = u_n^{-1} + 1$ et de premier terme 1, grâce à ce qui précède.