

Dans tous les exercices, le plan est muni d'un repère orthonormal direct  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

### Exercice 1

On considère le repère  $\mathcal{R}' = (A; \vec{u}, \vec{v})$  obtenu à partir de  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  par la rotation d'angle  $\frac{\pi}{3}$  et de centre  $O$ , suivie de la translation de vecteur  $\vec{w}(3, -2)$ .

1. Soit le point  $B$  de coordonnées  $(-1, 2)$  dans  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Déterminer ses coordonnées dans  $\mathcal{R}'$ .
2. Soit la droite  $D$  d'équation :  $\sqrt{3}x - y = 1$  dans  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Déterminer une équation de  $D$  dans  $\mathcal{R}'$ .

### Exercice 2

Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne et des équations paramétriques de la droite :

1. passant par le point  $A(-1, 2)$  et dirigée par le vecteur  $\vec{u}(5, 3)$ .
2. passant par les points  $B(-2, 3)$  et  $C(0, 5)$ .
3. passant par le point  $D(-1, 3)$  et de vecteur normal  $\vec{n}(-1, 2)$ .

### Exercice 3

Reconnaître les courbes d'équation polaire suivantes :  $\rho = 3 \cos \theta - 4 \sin \theta$ , et  $\rho = \frac{1}{\cos \theta + 3 \sin \theta}$ .

### Exercice 4

Soient  $A(1, 2)$ ,  $B(2, 3)$ ,  $C(3, 0)$ . Calculer l'aire du triangle  $ABC$ .

### Exercice 5

Calculer la distance du point  $A$  à la droite  $D$  dans les cas suivants :

1.  $A(1, 0)$  et  $D$  a pour équation cartésienne  $2x - 3y = 12$ .
2.  $A(-2, 3)$  et  $D$  passe par  $B(-1, 2)$ , de vecteur normal  $\vec{n}(2, 3)$ .
3.  $A(5, -4)$  et  $D$  passe par  $C(0, 2)$ , de vecteur directeur  $\vec{w}(1, 1)$ .

### Exercice 6

Soient les points  $A(-1, 1)$ ,  $B(3, 4)$  et  $C(1, 0)$ .

1. Déterminer la distance de  $C$  à la droite  $(AB)$ .
2. Déterminer une équation cartésienne de l'ensemble des points  $M$  tels que les distances de  $M$  à  $C$  et de  $M$  à la droite  $(AB)$  soient égales.

### Exercice 7

Soit  $a$  un réel strictement positif. On définit les points  $A(a, 0)$ ,  $B(-a, 0)$  et  $C(0, \sqrt{3}a)$ .

1. Quelle est la nature du triangle  $ABC$ ?
2. Donner un système d'inéquations déterminant les coordonnées des points intérieurs à ce triangle.
3. Montrer que la somme des distances d'un point intérieur à  $ABC$  aux trois côtés de ce triangle est constante.

### Exercice 8 *Tangente à un cercle*

1. Soit  $\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2ax - 2by = c$ . Soit  $M(x_0, y_0)$  un point de  $\mathcal{C}$ . Montrer que la tangente à  $\mathcal{C}$  en  $M$  a pour équation  $xx_0 + yy_0 - a(x + x_0) - b(y + y_0) = c$ .
2. Soit  $\mathcal{C}$  le cercle de centre  $\Omega(0, 10)$  et de rayon 10. Soit  $N(14, 15)$ . Former une équation cartésienne de la tangente menée de  $N$  à  $\mathcal{C}$  et de pente strictement négative.

**Exercice 9**

Soient  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{C}'$  deux cercles tangents extérieurement, de rayons respectifs  $R$  et  $R'$ . Une de leurs tangentes communes  $D$  est tangente à  $\mathcal{C}$  en  $A$  et à  $\mathcal{C}'$  en  $A'$ . On note  $d = AA'$ .

1. Montrer que  $d^2 = 4RR'$ .
2. Soit  $\mathcal{C}''$  un troisième cercle, tangent extérieurement à  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{C}'$  et tangent à  $D$ . Montrer que  $\frac{1}{\sqrt{R''}} = \frac{1}{\sqrt{R'}} + \frac{1}{\sqrt{R}}$ .

**Exercice 10**

Soit  $D$  la droite d'équation  $x - 2y + 2 = 0$  dans  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Soient les cercles  $\Gamma$  et  $\Gamma'$  d'équations :  $x^2 + y^2 + 4x - 2y = 4$  et  $x^2 + y^2 + 4y = \frac{9}{4}$ .

Déterminer le nombre de points d'intersection de  $D$  et  $\Gamma$ , de  $D$  et  $\Gamma'$ , de  $\Gamma$  et  $\Gamma'$ .

**Exercice 11**

Soit, pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ , la droite  $D_\lambda$  d'équation :  $(1 - \lambda^2)x + 2\lambda y - 4\lambda - 2 = 0$ .

1. Montrer qu'il existe un cercle  $\Gamma$  tel que pour tout  $\lambda$ ,  $D_\lambda$  est tangente à  $\Gamma$ .
2. Toute tangente à  $\Gamma$  est-elle une droite de la famille  $(D_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}}$  ?

**Exercice 12**

Soient  $A, B, C$  trois points non alignés du plan et  $M$  un point de la droite  $(AB)$ .

La parallèle à  $(BC)$  passant par  $M$  coupe  $(CA)$  en  $N$ , la parallèle à  $(AB)$  passant par  $N$  coupe  $(BC)$  en  $P$ , La parallèle à  $(CA)$  passant par  $P$  coupe  $(AB)$  en  $Q$ .

Montrer que les milieux des segments  $[MQ]$  et  $[AB]$  sont confondus.

**Exercice 13**

Soit  $ABC$  un triangle non aplati. On note  $a = BC, b = CA, c = AB, \widehat{A}$  l'angle non orienté  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ ,  $\widehat{B}$  l'angle non orienté  $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$  et  $\widehat{C}$  l'angle non orienté  $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$ .

On note  $p = \frac{1}{2}(a + b + c)$  le demi-périmètre,  $S$  l'aire du triangle  $ABC$  et  $R$  le rayon du cercle circonscrit.

1. Montrer que  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C}$ .
2. En déduire la formule de Héron :  $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ .
3. Montrer que  $\frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}} = \frac{c}{\sin \widehat{C}} = 2R$ .

**Exercice 14**

Soit  $A(-2, 4)$  et  $D$  et  $D'$  deux droites d'équations respectives :  $x + 2y + 3 = 0$  et  $3x + 2y + 1 = 0$ .

1. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de  $A$  sur  $D$ .
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite symétrique de  $D$  par rapport à  $A$ .
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite symétrique de  $D'$  par rapport à  $D$ .

**Exercice 15**

1. Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation cartésienne  $x^2 + y^2 + 4x - 3y + 6 = 0$ .
2. Déterminer une équation polaire du cercle d'équation cartésienne :  $x^2 + y^2 - 3x - 3y = 0$ .
3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection du cercle  $C : x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$  et de la droite  $D : x + 3y - 2 = 0$ .