

Exercice 1 *Un peu de pratique ...*

- Grâce à un changement de variable, intégrer (i.e. trouver les solutions) $y' = (8x + 2y + 1)^2$.
- Intégrer les équations différentielles suivantes :
 - $y' - \frac{y}{x} = x$,
 - $y' + \frac{2y}{x} = x^3$,
 - $y' = 2xy + y^3$,
 - $y' + y \cos(x) = \sin(x) \cos(x)$.
- Résoudre en tenant compte des conditions initiales :
 - $xy' + y - e^x = 0$ avec $y(a) = b$,
 - $y' - y \tan(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ avec $y(0) = 0$,
 - $y' + y = \cos(x)$ avec $y(0) = 1/2$,
 - $y' - 2y + x^2 = 0$ avec $y(0) = 1/4$.
- Intégrer $yy'' = y'^2$, $2y'' - y' - y = 4xe^{2x}$, $y'' - 2y' + y = xe^x$, $y'' + y = x \sin(x)$.
- Intégrer $y'' - 2y' + y = \sin(x) + \sinh(x)$, $y'' + y = 2x \cos(x) \cos(2x)$, $y^{(3)} + y'' + y' + y = xe^x$.
- Résoudre en tenant compte des conditions initiales :
 - $y'' - 5y' + 4y = 0$ avec $y(0) = 5$ et $y'(0) = 8$,
 - $y'' + \pi^2 y = 0$ avec $y(0) = y(1) = 0$,
 - $y'' - 2y' = e^{2x} + x^2 - 1$ avec $y(0) = 1/8$ et $y'(0) = 1$.

Exercice 2 *Tractrice*

La tractrice est une courbe pour laquelle la distance, le long de la tangente, entre le point de contact de la tangente et l'axe des abscisses est constante égale à a (un réel strictement positif).

- Montrer que (ou rappeler pourquoi) cette courbe vérifie l'équation différentielle $\sqrt{a^2 - y^2} y' = -y$.
- Montrer que cette équation à variables séparables peut s'intégrer en posant $y = a \cos(t)$ et en la ramenant à une fraction rationnelle grâce aux formules de l'angle moitié.
- Intégrer directement en posant $v^2 = a^2 - y^2$.

Exercice 3 *Hyperboles*

Déterminer la courbe qui passe par le point $(3; 2)$ et dont toute tangente coupe les axes de coordonnées en deux points dont le milieu est le point de tangence.

- Grâce au théorème de Thalès, montrer que, si (x, y) est un point de tangence, alors la tangente coupe les axes de coordonnées en $(2x, 0)$ et $(0, 2y)$, puis que la tangente admet $-y/x$ pour pente.
- Intégrer l'équation différentielle $y' = -y/x$ et conclure.

Exercice 4 *Dynamique des populations*

La loi de Verhulst (1845) propose que la taille y des populations soient gouvernées par la loi $y' = by(a - y)$, en fonction du temps, avec des paramètres bien choisis.

- Interpréter a et b en modélisant la croissance d'une population en fonction. On pourra par exemple suggérer qu'il y a des taux moyens constants de naissance et de décès, et que la lutte pour la nourriture est une fonction du nombre de rencontres possibles entre individus.
- Avec $a = 5$ et $b = 2$, trouver la solution qui vérifie $y(0) = 0, 1$. La représenter.

Exercice 5 *Courbes orthogonales*

On se donne une famille de courbes en fonction d'un paramètre réel a à l'aide de l'équation $x^2 + 2y^2 = a^2$.

1. Montrer que ce sont des ellipses et les représenter.
2. En dérivant l'équation par rapport à x , montrer que la famille de courbes satisfait à une équation différentielle.
3. Retrouver l'expression de la tangente en chaque point des ellipses grâce à cette équation (on écartera le cas des tangentes verticales).
4. Expliquer pourquoi l'équation différentielle $x - \frac{2y}{y'} = 0$ admet comme solutions des courbes normales à la famille d'ellipses précédente, en ce sens que les tangentes à ces courbes sont des normales aux ellipses. On écartera le cas des tangentes parallèles aux axes.
5. Intégrer cette équation linéaire du premier ordre (à coefficients non constants) en l'écrivant sous la forme $y' = 2y/x$.
6. Identifier et représenter cette famille de courbes solutions (on les dessinera sur le même graphique que les ellipses).
7. Reprendre l'exercice avec les familles de courbes : $x^2 + y^2 = a^2$, $y^2 = ax$, $xy = a^2$, $(x-a)^2 + y^2 = a^2$.

Exercice 6 *Fonctions de y/x*

1. Montrer qu'une équation de la forme $y' = g(y/x)$ peut s'intégrer grâce à la substitution $v(x) = y(x)/x$.
2. Utiliser cette méthode pour résoudre $y' = \frac{9x + 2y}{2x + y}$.
3. Intégrer $4x^2 + 3xy + y^2 + (4y^2 + 3xy + x^2)y' = 0$.
4. Intégrer $1 - 3x - 3y - (1 + x + y)y' = 0$.

Exercice 7 *Équation du second ordre*

Trouver une solution particulière de l'équation $y'' - 2y' + y = e^x \cos(x)$ de trois façons différentes :

1. En cherchant y sous la forme $y(x) = Ae^x \sin(x) + Be^x \cos(x)$;
2. En utilisant la méthode de variation de la constante ;
3. En résolvant $y'' - 2y' + y = e^{(1+i)x}$.

Exercice 8 *Wronskien*

Pour une équation différentielle linéaire (à coefficients non constants) du second ordre $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$, et pour deux solutions y_1 et y_2 de cette équation, on note $w(x)$ le déterminant des deux vecteurs $(y_1(x), y_1'(x))$ et $(y_2(x), y_2'(x))$.

1. Donner l'expression explicite de $w(x)$.
2. Montrer que w satisfait à une certaine équation différentielle linéaire du premier ordre.
3. En déduire $w(x) = w(x_0) \exp\left(-\int_{x_0}^x a(t)dt\right)$ pour tout (x_0, x) dans l'intervalle d'étude.
4. En déduire que w est toujours nul ou jamais nul sur l'intervalle d'étude.