

Devoir en temps libre à rendre par binôme. Chaque question est rédigée par l'un des membres du binôme, et chacun rédige à peu près la moitié du devoir.

Vous devez traiter l'un des deux exercices au choix. L'exercice (\*) est conseillé si vous voulez vous orienter vers une classe étoilée.

Avertissement : un binôme donné n'est autorisé à rendre qu'un seul DL pendant l'année. Il faut donc changer de partenaire à chaque DL !

*Les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Soignez la rédaction.*

**Exercice - La moyenne arithmético-géométrique** (2, le retour)

1. Dans cette question, on fixe  $x$  un réel dans  $[0; 1[$  et on pose  $I(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - x^2 \sin^2(\theta)}}$ .

(a) Montrer que  $I(x)$  est bien définie.

(b) Montrer que l'application  $u \mapsto \frac{(1+x)u}{1+xu^2}$  est une bijection strictement croissante de  $[0; 1]$  sur  $[0; 1]$  et que c'est même un  $C^1$ -difféomorphisme. En déduire que l'application  $f : \theta \mapsto \arcsin\left(\frac{(1+x)\sin(\theta)}{1+x\sin^2(\theta)}\right)$  est un  $C^1$ -difféomorphisme de  $[0; \pi/2[$  sur lui-même.

(c) En calculant la dérivée de  $\theta \mapsto \sin(f(\theta))$ , montrer, pour tout  $\theta$  dans  $[0; \pi/2[$ ,  $f'(\theta) = (1+x) \frac{1-x\sin^2(\theta)}{1+x\sin^2(\theta)} \frac{1}{\sqrt{1-x^2\sin^2(\theta)}}$ .

(d) Montrer, pour  $\theta$  dans  $[0; \pi/2[$ ,  $\left(\frac{1-x\sin^2(\theta)}{1+x\sin^2(\theta)}\right)^2 = 1 - \frac{4x}{(1+x)^2} \sin^2(f(\theta))$ .

(e) Montrer qu'on a  $0 \leq \frac{2\sqrt{x}}{1+x} < 1$ . En déduire, en prolongeant les formules à  $[0; \pi/2]$ ,

$$(1+x)I(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{f'(\theta)}{\sqrt{1 - \frac{4x}{(1+x)^2} \sin^2(f(\theta))}} d\theta = I\left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x}\right).$$

2. Dans cette question, on fixe  $a$  et  $b$  deux réels strictement positifs et on pose  $J(a, b) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sqrt{a^2 \cos^2(t) + b^2 \sin^2(t)}}$ .

(a) Montrer que  $J(a, b)$  est bien définie et, grâce à un changement de variable affine, qu'on a  $J(a, b) = J(b, a)$ .

(b) On suppose  $a > b$ . Montrer  $J(a, b) = \frac{1}{a} I\left(\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}\right)$ .

(c) On suppose encore  $a > b$ . Montrer  $J\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right) = \frac{2}{a+b} I\left(\frac{a-b}{a+b}\right) = J(a, b)$ .

(d) Soit  $M(a, b)$  la moyenne arithmético-géométrique de  $a$  et  $b$  (cf. DL 2) et  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de nombres réels tendant vers 0. Montrer  $I(x_n) \rightarrow I(0)$  et en déduire

$$J(a, b) = \frac{\pi}{2M(a, b)}.$$

**Exercice (\*) - Les fonctions elliptiques**

Soit  $k$  un réel vérifiant  $0 < k < 1$ . On considère l'équation différentielle

$$(E) \quad \dot{y}^2 = (1 - y^2)(1 - k^2 y^2).$$

On admet qu'il existe un intervalle  $I$  ouvert et centré en 0 tel que l'équation différentielle (E) admette une unique solution de classe  $C^2$  vérifiant  $y(0) = 0$  et  $y' > 0$  sur  $I$ . On notera sn cette solution. On pose  $\operatorname{dn} = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2}$  et  $\operatorname{cn} = \frac{\operatorname{sn}}{\operatorname{dn}}$ . Ces fonctions sont définies sur  $I$ .

1. En utilisant l'unicité de la solution de (E) sur  $I$ , vérifier que sn est une fonction impaire et que cn et dn sont des fonctions paires. Vérifier également les propriétés suivantes : (a)  $\operatorname{sn}^2 + \operatorname{cn}^2 = 1$ , (b)  $\dot{\operatorname{cn}} = -\operatorname{sn} \operatorname{dn}$ , (c)  $\dot{\operatorname{dn}} = -k^2 \operatorname{sn} \operatorname{cn}$ .
2. Soit  $w$  un réel fixé. On note  $s_1$  et  $s_2$  respectivement les fonctions  $u \mapsto \operatorname{sn}(u)$  et  $u \mapsto \operatorname{sn}(w-u)$  (définies respectivement sur  $I$  et sur  $w - I = \{w - t / t \in I\}$ ).  
(a) Calculer  $\dot{s}_2^2$ ,  $\ddot{s}_1$ ,  $\ddot{s}_2$  et montrer que, quand toutes les quantités sont définies,

$$\frac{\ddot{s}_1 s_2 - \ddot{s}_2 s_1}{\dot{s}_1^2 s_2^2 - \dot{s}_2^2 s_1^2} = -2k^2 \frac{s_1 s_2}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2}.$$

- (b) En déduire que, sur l'intervalle  $I \cap (w - I)$ ,  $\frac{\dot{s}_1 s_2 - \dot{s}_2 s_1}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2}$  ne dépend que de  $w$ .
- (c) Montrer que, quand  $u, v$  et  $u + v$  appartiennent à  $I$ ,

$$\operatorname{sn}(u + v) = \frac{\operatorname{sn}(u) \operatorname{cn}(v) \operatorname{dn}(v) + \operatorname{sn}(v) \operatorname{cn}(u) \operatorname{dn}(u)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u) \operatorname{sn}^2(v)}.$$

3. On admet que cette formule permet d'étendre les fonctions sn, cn et dn en des fonctions de classe  $C^2$  sur  $\mathbf{R}$  entier et que sn est solution de l'équation différentielle (E) sur  $\mathbf{R}$ . On admet également la formule d'addition suivante pour cn (que l'on peut obtenir de la même façon que pour sn) :

$$\operatorname{cn}(u + v) = \frac{\operatorname{cn}(u) \operatorname{cn}(v) - \operatorname{sn}(u) \operatorname{sn}(v) \operatorname{dn}(u) \operatorname{dn}(v)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u) \operatorname{sn}^2(v)}.$$

Interpréter ces deux formules d'addition quand  $k$  tend vers 0.

4. On admet que  $\operatorname{sn}'$  s'annule sur  $\mathbf{R}_+$  et qu'elle a un plus petit zéro strictement positif. On le note  $K$ .  
(a) Calculer  $\operatorname{sn}(K)$  et  $\operatorname{cn}(K)$  et montrer que, pour tout  $u$  réel,  $\operatorname{sn}(u + K) = \frac{\operatorname{sn}'(u)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u)}$ .  
(b) Montrer que, pour tout  $u$  réel,  $\operatorname{sn}'(u + K) = -\frac{(1 - k^2) \operatorname{sn}(u)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u)}$ .  
(c) Montrer que sn est  $4K$ -périodique et dresser un tableau de variation de sn sur  $[0, 4K]$ .  
(d) Montrer que, pour tout  $u, v, w$  dans  $\mathbf{R}$ ,

$$(\operatorname{cn}(u) \operatorname{cn}(w) + \operatorname{dn}(v) \operatorname{sn}(u) \operatorname{sn}(w) = \operatorname{cn}(v)) \Leftrightarrow (w \equiv u \pm v [4K]).$$

5. Donner des arguments permettant de démontrer certains des points admis.

**Exercice - La moyenne arithmético-géométrique** (2, le retour)

1. (a) Le terme sous le radical est compris entre  $1 - x^2$  et 1 et donc l'intégrande est une fonction bien définie, continue sur l'intervalle d'étude et donc  $I(x)$  est bien définie.
- (b) La dérivée de  $u \mapsto \frac{(1+x)u}{1+xu^2}$  est  $u \mapsto \frac{(1+x)(1-xu^2)}{(1+xu^2)^2}$  et est donc strictement positive sur  $[0; 1]$ , puisque  $0 \leq xu^2 \leq x < 1$  sur  $[0; 1]$ . Cette première fonction est donc de classe  $C^1$  et strictement croissante. D'après le théorème de la bijection, c'est donc un  $C^1$ -difféomorphisme de  $[0; 1]$  sur son image. Et comme elle prend les valeurs 0 et 1 en 0 et 1 respectivement, c'est une  $C^1$ -difféomorphisme de  $[0; 1]$  sur lui-même.  
Or  $\sin$  est un  $C^1$ -difféomorphisme de  $[0; \pi/2[$  sur  $[0; 1[$ , de réciproque  $\arcsin$ , donc  $f$  est un  $C^1$ -difféomorphisme de  $[0; \pi/2[$  sur lui-même.
- (c) Par composition  $\sin \circ f$  est une fonction de classe  $C^1$  sur  $[0; \pi/2[$ . Soit donc  $\theta$  dans  $[0; \pi/2[$ . Par dérivation de  $\theta \mapsto \sin(f(\theta))$ , il vient

$$\cos(f(\theta)) \cdot f'(\theta) = (1+x) \cos(\theta) \frac{1-x \sin^2(\theta)}{(1+x \sin^2(\theta))^2}.$$

$$\text{Or } \cos^2(f(\theta)) = 1 - \sin^2(f(\theta)) = \cos^2(\theta) \frac{1-x^2 \sin^2(\theta)}{(1+x \sin^2(\theta))^2}.$$

Par positivité du cosinus sur  $[0; \pi/2[$ , il vient  $\cos(f(\theta)) = \cos(\theta) \frac{\sqrt{1-x^2 \sin^2(\theta)}}{1+x \sin^2(\theta)}$  et donc  $\cos(f(\theta)) \neq 0$  et  $f'(\theta) = (1+x) \frac{1-x \sin^2(\theta)}{1+x \sin^2(\theta)} \frac{1}{\sqrt{1-x^2 \sin^2(\theta)}}$ .

- (d) Soit  $\theta$  dans  $[0; \pi/2[$ . On a  $1 - \frac{4x}{(1+x)^2} \sin^2(f(\theta)) = 1 - 4x \frac{\sin^2(\theta)}{(1+x \sin^2(\theta))^2}$  et donc

$$1 - \frac{4x}{(1+x)^2} \sin^2(f(\theta)) = \left( \frac{1-x \sin^2(\theta)}{1+x \sin^2(\theta)} \right)^2.$$

- (e) D'après l'inégalité entre moyenne géométrique et moyenne arithmétique appliquée aux réels strictement positifs 1 et  $x$ , on a  $\sqrt{x} \leq (1+x)/2$  avec égalité uniquement pour  $x = 1$ . Il en résulte  $0 \leq \frac{2\sqrt{x}}{1+x} < 1$ .

La formule de la question (c) se prolonge en  $\theta = \pi/2$  par  $f'(\pi/2) = \sqrt{(1-x)/(1+x)}$  et donc  $f$  est en fait un  $C^1$ -difféomorphisme de  $[0; \pi/2]$  sur lui-même. La formule du (d) se prolonge en  $((1-x)/(1+x))^2 = 1 - 4x/(1+x)^2$  et ainsi la formule de changement de variable donne donc, par positivité de  $f'$ ,

$$(1+x)I(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{f'(\theta)}{\sqrt{1 - \frac{4x}{(1+x)^2} \sin^2(f(\theta))}} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \frac{4x}{(1+x)^2} \sin^2(\varphi)}}$$

$$\text{i.e. } (1+x)I(x) = I\left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x}\right).$$

2. (a) Le terme sous le radical est toujours strictement positif puisque les deux carrés ne s'annulent pas simultanément. L'intégrande est donc une fonction bien définie et continue sur l'intervalle d'étude. Par conséquent  $J(a, b)$  est bien définie. Le changement de variable affine  $u = \pi/2 - t$  permet d'échanger sinus et cosinus ou, autrement dit,  $a$  et  $b$ . D'où  $J(a, b) = J(b, a)$ .
- (b) Pour  $t$  dans  $[0; \pi/2]$ , on a  $a^2 \cos^2(t) + b^2 \sin^2(t) = a^2(1 - \sin^2(t)) + b^2 \sin^2(t) = a^2(1 - (a^2 - b^2) \sin^2(t)/a^2)$ . De plus  $0 \leq \sqrt{a^2 - b^2} < \sqrt{a^2}$  et  $\sqrt{a^2} = a$ , donc on a  $0 \leq \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} < 1$ . D'où  $J(a, b) = \frac{1}{a} I\left(\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}\right)$ .
- (c) On suppose  $a > b$ . On a, par inégalité entre moyennes,  $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$  et donc

$$J\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right) = \frac{2}{a+b} I\left(\frac{2\sqrt{\frac{(a+b)^2}{4} - ab}}{a+b}\right) = \frac{2}{a+b} I\left(\frac{a-b}{a+b}\right)$$

et, d'après 1(e), et puisque  $1 + \frac{a-b}{a+b} = \frac{2a}{a+b}$ ,

$$I\left(\frac{a-b}{a+b}\right) = \frac{a+b}{2a} I\left(\frac{2\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}}{\frac{2a}{a+b}}\right)$$

soit  $I\left(\frac{a-b}{a+b}\right) = \frac{a+b}{2a} I\left(\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}\right)$ . D'où  $J(a, b) = J\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right)$ .

Cette dernière inégalité est vraie en échangeant  $a$  et  $b$  d'après (a), et est une tautologie si  $a = b$ . Les calculs de (b) sont encore valides si  $a = b$ . Par conséquent l'égalité  $J(a, b) = J\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right)$  est valide sans restriction sur  $a$  et  $b$ .

- (d) Pour  $x$  dans  $[0; 1[$ , on a

$$I(x) - I(0) = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2 \sin^2(\theta)}}{\sqrt{1 - x^2 \sin^2(\theta)}} d\theta.$$

Or

$$0 \leq 1 - \sqrt{1 - x^2 \sin^2(\theta)} = \frac{1 - (1 - x^2 \sin^2(\theta))}{1 + \sqrt{1 - x^2 \sin^2(\theta)}} \leq x^2$$

et le dénominateur est minoré par  $\sqrt{1 - x^2}$ , de sorte qu'on a, en comparant l'aire représentée par l'intégrale à un rectangle de largeur  $\pi/2$  et de hauteur  $x^2/\sqrt{1 - x^2}$  la contenant :

$$0 \leq I(x) - I(0) \leq \frac{\pi}{2} \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}}$$

et cette quantité est une fonction de  $x$  qui tend vers 0 en 0. Donc, si  $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$  est une suite de nombres réels tendant vers 0, alors, par le théorème d'encadrement des limites, on a  $I(x_n) \rightarrow I(0)$ .

Si  $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$  sont deux suites de réels, avec  $a_n > b_n$  pour tout entier  $n$ , et tendant vers une limite commune  $c$  non nulle, la suite  $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$  définie par  $x_n = \sqrt{a_n^2 - b_n^2}/a_n$  tend vers 0. Et donc, d'après la formule 2(b),  $J(a, b)$  tend vers  $I(0)/c$ . En raison de 2(a), l'hypothèse  $a_n > b_n$  pour tout entier  $n$  est superflue. En particulier on peut appliquer ce résultat aux suites définissant  $M(a, b)$  et il vient  $J(a_n, b_n) \rightarrow I(0)/M(a, b)$ . Or  $I(0) = \pi/2$  et  $(J(a_n, b_n))_{n \in \mathbf{N}}$  est une suite constante égale à  $J(a, b)$  d'après 2(c). D'où, par unicité de la limite,

$$J(a, b) = \frac{\pi}{2M(a, b)}.$$

### Exercice (\*) - Les fonctions elliptiques

1. Par composition, et puisque  $I = -I$ , la fonction  $x \rightarrow -\operatorname{sn}(-x)$  est de classe  $C^2$  sur  $I$  et sa dérivée est la fonction  $x \rightarrow \operatorname{sn}(-x)$ . Par conséquent la fonction  $x \rightarrow \operatorname{sn}(-x)$  vérifie (E) sur l'intervalle  $I = -I$ , y est de classe  $C^2$ , vaut 0 en 0 et est de dérivée strictement positive. Par unicité d'une telle fonction, on a donc  $\operatorname{sn}(x) = -\operatorname{sn}(-x)$  pour  $x$  dans  $I$ , i.e.  $\operatorname{sn}$  est impaire.

Puisque la dérivée de  $\operatorname{sn}$  est strictement positive sur  $I$ , elle ne s'y annule pas. Les fonctions continues  $1 - \operatorname{sn}^2$  et  $1 - k^2 \operatorname{sn}^2$  ne s'annulent donc pas sur  $I$  et y sont par conséquent strictement positives puisqu'elles valent 1 en 0. Par conséquent  $\operatorname{dn}$  est bien définie et ne s'annule pas sur  $I$ . Il en résulte également  $|\operatorname{sn}| < 1$  sur  $I$ .

Puisque  $\operatorname{sn}$  est impaire sur  $I$ ,  $\operatorname{dn}$  y est paire ainsi que  $\operatorname{sn}$ . Il va de même pour  $\operatorname{cn}$  qui est défini comme quotient de deux fonctions paires.

On a

$$\operatorname{cn}^2 = \frac{\operatorname{sn}^2}{\operatorname{dn}^2} = \frac{(1 - \operatorname{sn}^2)(1 - k^2 \operatorname{sn}^2)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2} = 1 - \operatorname{sn}^2$$

et donc

$$\operatorname{sn}^2 + \operatorname{cn}^2 = 1.$$

Comme  $1 - k^2 \operatorname{sn}^2$  est strictement positive sur  $I$ , par composition,  $\operatorname{dn}$  existe et est de classe  $C^2$  sur  $I$ . De plus elle y est non nulle. Par conséquent  $\operatorname{cn}$  est bien définie sur  $I$ , y est strictement positive et de classe  $C^1$ . En dérivant l'égalité précédente, on trouve

$$\operatorname{sn} \operatorname{sn}' + \operatorname{cn} \operatorname{cn}' = 0.$$

Comme  $\operatorname{sn}$  est non nul sur  $I$ , il en est de même pour  $\operatorname{cn}$ . On a donc  $\operatorname{cn}' = -\operatorname{sn}' \operatorname{dn}$ .

En dérivant  $k^2 \operatorname{sn}^2 + \operatorname{dn}^2 = 1$ , on obtient  $k^2 \operatorname{sn} \operatorname{sn}' + \operatorname{dn}' \operatorname{dn} = 0$  et donc, puisque  $\operatorname{dn}$  n'est jamais nul,  $\operatorname{dn}' = -k^2 \operatorname{sn}' \operatorname{cn}$ .

2. Remarque : les formules précédentes entraînent immédiatement que les fonctions  $\operatorname{sn}$ ,  $\operatorname{cn}$  et  $\operatorname{dn}$  sont de classe  $C^\infty$  sur  $I$ .

(a) Par définition  $s_1 = \operatorname{sn}$ , et donc on a  $\dot{s}_1 = \operatorname{cn} \cdot \operatorname{dn}$  et

$$\ddot{s}_1 = -\operatorname{sn}' \cdot \operatorname{dn}^2 - k^2 \operatorname{sn}' \cdot \operatorname{cn}^2 = -(k^2 + 1)s_1 + 2k^2 s_1^3.$$

Par composition  $s_2$  est de classe  $C^2$  sur  $w - I$  et on a, pour  $u$  dans  $w - I$ ,

$$\dot{s}_2(u) = -\dot{s}_1(w - u) \quad \text{et} \quad \ddot{s}_2(u) = \ddot{s}_1(w - u)$$

et donc

$$\dot{s}_2^2 = (1 - s_2^2)(1 - k^2 s_2^2)$$

et

$$\ddot{s}_2 = -(k^2 + 1)s_2 + 2k^2 s_2^3.$$

Par conséquent, quand toutes les quantités sont définies,

$$\frac{\ddot{s}_1 s_2 - \ddot{s}_2 s_1}{\dot{s}_1^2 s_2^2 - \dot{s}_2^2 s_1^2} = \frac{2k^2 s_1 s_2 [s_1^2 - s_2^2]}{[s_1^2 - s_2^2](-1 + k^2 s_1^2 s_2^2)} = -2k^2 \frac{s_1 s_2}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2}.$$

Remarquons qu'en fait, sur  $I \cap (w - I)$ , on a

$$(\dot{s}_1 s_2 - \dot{s}_2 s_1) (1 - k^2 s_1^2 s_2^2) = -2k^2 s_1 s_2 (\dot{s}_1^2 s_2^2 - \dot{s}_2^2 s_1^2)$$

par le même calcul puisque cette égalité est valide dès que toutes les quantités sont définies, i.e. sur  $I \cap (w - I)$ .

(b) Formellement

$$\frac{\ddot{s}_1 s_2 - \ddot{s}_2 s_1}{\dot{s}_1 s_2 - \dot{s}_2 s_1} = -2k^2 \frac{s_1 s_2 (\dot{s}_1 s_2 + \dot{s}_2 s_1)}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2}$$

et donc

$$d \log(\dot{s}_1 s_2 - \dot{s}_2 s_1) = d \log(1 - k^2 s_1^2 s_2^2);$$

d'où

$$\frac{\dot{s}_1 s_2 - \dot{s}_2 s_1}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2} = \text{Cte}.$$

Plus rigoureusement, puisque  $|s_1| < 1$  sur  $I$ ,  $|s_2| < 1$  sur  $w - I$ , on a  $1 - k^2 s_1^2 s_2^2 > 1 - k^2 > 1$  sur  $I \cap (w - I)$ . Par conséquent la fonction  $\frac{\dot{s}_1 s_2 - \dot{s}_2 s_1}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2}$  est de classe  $C^1$  sur  $I \cap (w - I)$  en tant que quotient de telles fonctions dont le dénominateur ne s'annule pas. On peut donc écrire

$$\frac{d}{du} \left( \frac{\dot{s}_1 s_2 - \dot{s}_2 s_1}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2} \right) = \frac{(\ddot{s}_1 s_2 - \ddot{s}_2 s_1)(1 - k^2 s_1^2 s_2^2) + 2k^2 (\dot{s}_1 s_2 - \dot{s}_2 s_1) s_1 s_2 (\dot{s}_1 s_2 + \dot{s}_2 s_1)}{(1 - k^2 s_1^2 s_2^2)^2}$$

et donc cette dérivée est nulle, d'après la remarque de fin de la question précédente, i.e. sur l'intervalle  $I \cap (w - I)$ ,  $\frac{\dot{s}_1 s_2 - \dot{s}_2 s_1}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2}$  ne dépend que de  $w$ .

(c) Soit  $u$  et  $v$  tels que  $u, v$  et  $u+v$  appartiennent à  $I$ . Appliquons les résultats précédents en choisissant pour  $w$  la valeur  $u+v$ . On a alors  $u \in I \cap (w - I)$  et on peut appliquer le résultat précédent. Comme  $s_2(u) = \text{sn}(v)$  et  $\dot{s}_2(u) = -\dot{\text{sn}}(v)$ , il en résulte qu'il existe une fonction  $C$  telle que

$$\frac{\text{sn}(u) \text{sn}(v) + \dot{\text{sn}}(v) \text{sn}(u)}{1 - k^2 \text{sn}^2(u) \text{sn}^2(v)} = C(w).$$

Or  $\operatorname{sn}(0) = 0$  et donc  $\operatorname{sn}^2(0) = 1$ . Comme  $\operatorname{sn}(0) > 0$ , il vient  $\operatorname{sn}(0) = 1$ . En faisant  $v = 0$  on obtient donc  $C(u) = \operatorname{sn}(u)$ , i.e.  $C = \operatorname{sn}$ . D'où la formule demandée en utilisant  $\operatorname{sn} = \operatorname{cn} \cdot \operatorname{dn}$ .

3. Quand  $k$  vaut 0, l'équation (E) devient  $(y')^2 + y^2 = 1$ . Une fonction de classe  $C^2$  qui est solution de (E) vérifie donc, par dérivation,  $y'(y'' + y) = 0$ . Et donc, sur un intervalle où  $y'$  est strictement positive, on a  $y'' + y = 0$ . Autrement dit  $y$  est de la forme  $a \cos + b \sin$ . Une telle fonction vérifiant  $y(0) = 0$  est donc un multiple de la fonction sinus :  $y = b \sin$ . En reprenant l'équation il vient  $b^2 = 1$  et donc, par positivité de  $y'$ ,  $y = \sin$ . Autrement dit, pour  $k = 0$ , l'équation (E) admet une unique solution de classe  $C^2$ , s'annulant en 0 et de dérivée strictement positive sur un intervalle  $I$  symétrique par rapport à 0, à savoir la fonction sinus sur  $] -\pi/2; \pi/2[$ .

En d'autres termes, en faisant tendre  $k$  vers 0, on retrouve les fonctions trigonométriques usuelles :  $\operatorname{sn}$  devient  $\sin$ ,  $\operatorname{cn}$  devient  $\cos$  et  $\operatorname{dn}$  devient la fonction identiquement égale à 1. Les formules du texte redonnent alors les formules d'addition pour  $\sin$  et  $\cos$ .

4. Dans tout ce qui suit, on est donc guidé par ce que l'on sait déjà des fonctions trigonométriques. On a alors  $K = \pi/2$ . Et on a  $\sin(u + \pi/2) = \cos(u)$ ,  $\cos(u + \pi/2) = -\sin(u)$ ,  $\sin(u + \pi) = -\sin(u)$ ,  $\sin$  est  $2\pi$ -périodique.

- (a) Par définition de  $K$ ,  $\operatorname{sn}$  est positive sur  $[0; K]$  et donc  $\operatorname{sn} y$  est croissante. Puisque  $\operatorname{sn}(K) = 0$ , on a  $\operatorname{cn}(K) = 0$ . On a donc  $|\operatorname{sn}(K)| = 1$  et donc, par croissance de  $\operatorname{sn}$  et puisque  $\operatorname{sn}(0) = 0$ , on a  $\operatorname{sn}(K) = 1$ . Pour  $u$  réel, il vient d'après les formules d'addition :

$$\operatorname{sn}(u + K) = \frac{\operatorname{sn}(u) \operatorname{cn}(K) \operatorname{dn}(K) + \operatorname{sn}(K) \operatorname{cn}(u) \operatorname{dn}(u)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u) \operatorname{sn}^2(K)} = \frac{\operatorname{cn}(u) \operatorname{dn}(u)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u)}$$

- (b) La fonction  $u \mapsto \operatorname{sn}(u + K)$  est de classe  $C^2$  sur  $\mathbf{R}$  par composition. En dérivant l'identité  $\operatorname{sn}(u + K) = \frac{\operatorname{sn}(u)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u)}$ , il vient, pour  $u$  réel,

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u + K) &= \frac{\operatorname{sn}'(u)[1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u)] + 2k^2 \operatorname{sn}(u) \operatorname{sn}^2(u)}{(1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u))^2} \\ &= \frac{\operatorname{sn}(u)[2k^2 \operatorname{sn}^2(u) - (1 + k^2)] + 2k^2 \operatorname{sn}(u)[1 - \operatorname{sn}^2(u)]}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u)} \\ &= -\frac{(1 - k^2) \operatorname{sn}(u)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u)} \end{aligned}$$

- (c) Remarquons que  $\operatorname{sn}$  est impaire et que  $u \mapsto \operatorname{sn}(u + K)$  est paire. Il en résulte, pour  $u$  réel,

$$\operatorname{sn}(u + 2K) = \operatorname{sn}((u + K) + K) = \operatorname{sn}(-(u + K) + K) = \operatorname{sn}(-u) = -\operatorname{sn}(u)$$

et donc  $\operatorname{sn}(u + 4K) = -\operatorname{sn}(u + 2K) = \operatorname{sn}(u)$ , i.e.  $\operatorname{sn}$  est  $4K$  périodique.

Sur  $[0, K[$ ,  $\operatorname{sn}$  est strictement positif car il ne s'annule pas. Grâce à la formule donnant  $\operatorname{sn}(u + K)$ , on voit que  $\operatorname{sn}$  est négatif sur  $[K, 2K[$ . Enfin, en utilisant  $\operatorname{sn}(u + 2K) =$

–  $\text{sn}(u)$ , on trouve le tableau de variations :

	0	$K$	$2K$	$3K$	$4K$
	1				
$\text{sn}$	0	↗	↘	0	↘
	-1				
	0	↘	↗	0	↗

- (d) Soit  $u$  et  $v$  dans  $\mathbf{R}$ . On note avec un indice 1 ou 2 les fonctions dépendant de  $u$  ou  $v$ . Par exemple  $c_1 = \text{cn}(u)$ ,  $d_2 = \text{dn}(v)$  etc. On calcule l'expression

$$\text{cn}(u) \text{cn}(w) + \text{dn}(v) \text{sn}(u) \text{sn}(w)$$

pour  $w = u + v$ , en utilisant les formules d'addition pour développer  $\text{cn}(w)$  et  $\text{sn}(w)$ . Le dénominateur est  $1 - k^2 s_1^2 s_2^2$ . Pour le numérateur, il vient :

$$c_1(c_1 c_2 - s_1 s_2 d_1 d_2) + d_2 s_1 (s_1 c_2 d_2 + s_2 c_1 d_1) \quad \text{i.e.} \quad c_1^2 c_2 + s_1^2 c_2 d_2^2$$

et, en développant  $c_1^2$  et  $d_2^2$ , on trouve

$$c_2(1 - s_1^2 + s_1^2(1 - k^2 s_2^2)) = c_2(1 - k^2 s_1^2 s_2^2) .$$

D'où

$$\text{cn}(u) \text{cn}(w) + \text{dn}(v) \text{sn}(u) \text{sn}(w) = \text{cn}(v)$$

pour  $w = u + v$ . C'est encore vrai pour  $w = u - v$  puisque la formule précédente donne

$$\text{cn}(u) \text{cn}(u - v) + \text{dn}(v) \text{sn}(u) \text{sn}(u - v) = \text{cn}(-v) = \text{cn}(v) .$$

Par  $4K$ -périodicité, il vient :  $\forall (u, v, w) \in \mathbf{R}^3$ ,

$$(w \equiv u \pm v [4K]) \Rightarrow (\text{cn}(u) \text{cn}(w) + \text{dn}(v) \text{sn}(u) \text{sn}(w) = \text{cn}(v)) .$$

Fixons maintenant  $u$  et  $v$  dans  $\mathbf{R}$  et cherchons les  $w$  réels tels que  $\text{cn}(u) \text{cn}(w) + \text{dn}(v) \text{sn}(u) \text{sn}(w) = \text{cn}(v)$ , i.e. tels que  $c_1 \text{cn}(w) + d_2 s_1 \text{sn}(w) = c_2$ .

Si  $c_1 = 0$ ,  $s_1 \neq 0$  (puisque  $s_1^2 = 1 - c_1^2 = 1$ ) et  $d_2 \neq 0$  (puisque  $|s_2| \leq 1$  et  $d_2^2 = 1 - k^2 s_2^2 \geq 1 - k^2 > 0$ ). Par conséquent, si  $c_1 = 0$ , l'équation s'écrit  $\text{sn}(w) = c_2 / s_1 d_2$ . D'après le tableau de variation précédent, cette équation a au plus deux solutions dans  $[0; 4K[$ . Si  $u + v$  et  $u - v$  sont distincts modulo  $4K$ , alors ce sont donc les deux solutions de l'équation (modulo  $4K$ ). Sinon, c'est qu'on a  $v \equiv 2K [4K]$  et donc  $s_2 = 0$ ,  $d_2 = 1$  et  $|c_2| = 1$ . Comme  $c_1 = 0$ ,  $|s_1| = 1$  et on cherche des  $w$  tels que  $\text{sn}(w)$  est égal à un réel dont la valeur absolue est 1. Il y a un seul tel réel, modulo  $4K$ , d'après le tableau de variation précédent et c'est donc  $u + v$  (ou  $u - v$ ) modulo  $4K$ .

On suppose maintenant  $c_1 \neq 0$ . On a :

$$\begin{aligned} c_1 \text{cn}(w) + d_2 s_1 \text{sn}(w) = c_2 &\iff c_1 \text{cn}(w) = c_2 - d_2 s_1 \text{sn}(w) \\ &\iff \begin{cases} c_1^2 \text{cn}^2(w) = (c_2 - d_2 s_1 \text{sn}(w))^2 \\ \text{sgn}(\text{cn}(w)) = \text{sgn}(c_2 - d_2 s_1 \text{sn}(w)) \cdot \text{sgn}(c_1) \end{cases} \end{aligned}$$



En utilisant  $\operatorname{cn}^2(w) = 1 - \operatorname{sn}^2(w)$ , la première équation du dernier système est en fait une équation du second degré en  $\operatorname{sn}(w)$ , à savoir

$$(d_2^2 s_1^2 + c_1^2) \operatorname{sn}^2(w) - 2c_2 d_2 s_1 \operatorname{sn}(w) + c_2^2 - c_1^2 = 0 .$$

Une telle équation a au plus deux solutions. D'après le tableau de variation une équation du type  $\operatorname{sn}(w) = \alpha$  a au plus deux solutions et s'il y en a deux les signes de  $\operatorname{cn}(w)$  en ces deux solutions sont opposés. Par conséquent un système du type  $(\operatorname{sn}(w) = \alpha \text{ et } \operatorname{sgn}(\operatorname{cn}(w)) = \varepsilon)$  a au plus une solution. Le système

$$\begin{cases} c_1^2 \operatorname{cn}^2(w) = (c_2 - d_2 s_1 \operatorname{sn}(w))^2 \\ \operatorname{sgn}(\operatorname{cn}(w)) = \operatorname{sgn}(c_2 - d_2 s_1 \operatorname{sn}(w)) \cdot \operatorname{sgn}(c_1) \end{cases}$$

a donc au plus deux solutions.

Comme dans le cas  $c_1 = 0$ , si  $u + v$  et  $u - v$  sont distincts modulo  $4K$ , alors ce sont les deux solutions de l'équation (modulo  $4K$ ). Sinon, on a  $v \equiv 2K [4K]$  et donc  $d_2 = 1$ ,  $d_2^2 s_1^2 + c_1^2 = s_1^2 + c_1^2 = 1$ ,  $c_2^2 - c_1^2 = 1 - c_1^2 = s_1^2$  et l'équation du second degré s'écrit  $\operatorname{sn}^2(w) - 2c_2 s_1 \operatorname{sn}(w) + s_1^2 = 0$ . Comme  $|c_2| = 1$ , c'est une équation à racine double (à savoir  $c_2 s_1$ ) et le système complet a donc au plus une solution qui est donc  $u + v$  (ou  $u - v$ ) modulo  $4K$ .

Il résulte de cette étude

$$(w \equiv u \pm v [4K]) \iff (\operatorname{cn}(u) \operatorname{cn}(w) + \operatorname{dn}(v) \operatorname{sn}(u) \operatorname{sn}(w) = \operatorname{cn}(v)) .$$

5. Soit  $(E')$  l'équation différentielle  $y' = \sqrt{(1 - y^2)(1 - k^2 y^2)}$  avec condition initiale  $y(0) = 0$ . Comme la fonction  $t \mapsto \sqrt{(1 - t^2)(1 - k^2 t^2)}$  est de classe  $C^1$  en 0, on peut donc appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz à  $(E')$ . Il existe ainsi un intervalle  $I$  ouvert contenant 0 et une fonction  $y$  de classe  $C^1$  sur  $I$  vérifiant l'équation  $(E')$  sur tout  $I$ . Comme  $y'(0) = 1$  et  $y'$  est continue au voisinage de 0, on peut supposer que  $I$  est suffisamment petit pour que  $y'$  ne s'annule pas sur  $I$  (ce qui est d'ailleurs équivalent à  $|y| < 1$  sur  $I$ ) et, quitte à remplacer  $I$  par  $I \cap -I$ , centré en 0. Comme  $t \mapsto \sqrt{(1 - t^2)(1 - k^2 t^2)}$  est de classe  $C^1$  sur  $] -1; 1[$ ,  $y$  est en fait de classe  $C^\infty$  sur  $I$ . En particulier  $y$  est bien une solution de  $(E)$  de classe  $C^2$  sur  $I$ .

Le théorème de Cauchy-Lipschitz entraîne aussi que toute autre solution de  $(E')$  coïncide avec  $y$  sur leur intervalle commun de définition.

Soit maintenant  $\tilde{y}$  une solution de  $(E)$  définie sur l'intervalle  $I$ . Par continuité de  $\tilde{y}'$ , il existe un intervalle  $J$  inclus dans  $I$  tel que  $\tilde{y}'$  soit strictement positive sur  $J$  et donc tel que  $\tilde{y}$  soit une solution de  $(E')$  sur  $J$ . D'où  $y = \tilde{y}$  sur  $J$ . Choisissons  $J$  maximal pour cette propriété de (stricte) positivité de  $\tilde{y}'$ . Supposons que  $J$  soit strictement inclus dans  $I$ , c'est-à-dire qu'au moins l'une de ses bornes appartient à  $I$ . Soit  $a$  une telle borne. Comme  $\tilde{y}'$  est continue sur  $I$  et  $a$  appartient à  $I$ ,  $\tilde{y}'(a)$  ne peut être strictement positif, sinon  $\tilde{y}'$  le serait encore dans un voisinage de  $a$  et cela contredirait la maximalité de  $J$ . Et comme  $\tilde{y}'$  est strictement positive sur  $J$ , il en résulte  $\tilde{y}'(a) = 0$ . Mais comme  $\tilde{y} = y$  sur  $J$ , par continuité de  $y'$  en  $a$  (qui appartient à  $I$ ), on doit donc avoir  $y'(a) = 0$ , ce qui est impossible vu le choix de  $I$ . On en conclut donc que  $J = I$  et donc que  $\tilde{y} = y$  sur  $I$ .

Pour le choix de  $I$  que l'on a fait, on a donc existence et unicité d'une solution de classe  $C^2$  de  $(E)$  vérifiant  $y(0) = 0$  et  $y' > 0$ .

Le calcul pour montrer la formule d'addition de  $\text{cn}$  sur  $I$  est direct et se fait comme pour  $\text{sn}$ . Posons  $I = ]-a; a[$ . Une fois obtenu des fonctions  $\text{sn}$  et  $\text{cn}$  sur  $I$ , on peut définir des fonctions  $\text{sn}$  et  $\text{cn}$  sur  $] -2a; 2a[$  en calculant les fonctions  $\text{sn}$  et  $\text{cn}$  en  $t$  grâce aux formules d'addition de  $\text{sn}$  et  $\text{cn}$  prises en  $u$  et  $v$  égaux à  $t/2$  :

$$\text{sn}(t) = \frac{2 \text{sn}(t/2) \text{cn}(t/2) \text{dn}(t/2)}{1 - k^2 \text{sn}^4(t/2)} \quad \text{et} \quad \text{cn}(t) = \frac{\text{cn}^2(t/2) - \text{sn}^2(t/2) \text{dn}^2(t/2)}{1 - k^2 \text{sn}^4(t/2)}.$$

Lorsque  $t$  appartient à  $I$ , on obtient le même résultat qu'en calculant directement la fonction en  $t$ , d'après les formules d'addition. On a donc obtenu un prolongement des fonctions  $\text{sn}$  et  $\text{cn}$  sur  $] -2a; 2a[$ . Ces prolongements vérifient  $\text{sn}^2 + \text{cn}^2 = 1$ , grâce à un calcul direct et grâce aux propriétés obtenues sur  $I$ , et ils sont de classe  $C^2$  par définition puisque ce sont des quotients bien définis de telles fonctions. On a en particulier  $|\text{sn}| \leq 1$  et donc  $\text{dn}$  peut se prolonger par la formule  $\text{dn}(t) = \sqrt{1 - k^2 \text{sn}^2(t)}$  à l'intervalle  $] -2a; 2a[$  en une fonction de classe  $C^2$ . On vérifie enfin que  $\text{sn}$  ainsi définie est solution de  $(E)$  sur  $] -2a; 2a[$  (c'est le point le plus fastidieux, mais c'est un calcul direct). On en déduit les propriétés (b) et (c) et donc les formules d'addition sur  $] -2a; 2a[$ . Le même argument permet alors de prolonger à  $] -4a; 4a[$ , puis  $] -8a; 8a[$  etc. et donc sur  $\mathbf{R}$  entier. Concrètement, pour calculer  $\text{sn}(t)$  on cherche  $n$  tel que  $t/2^n \in I$  puis on calcule  $\text{sn}(t)$  à partir des formules d'addition et de la valeur de  $\text{sn}$ ,  $\text{cn}$  et  $\text{dn}$  en  $t/2^n$ .

Montrons qu'il existe  $K$  tel que  $\text{sn}(K) = 1$  et tel que  $\text{sn}$  soit monotone sur  $[0, K]$ . On va montrer en fait que  $K$  est le premier zéro (positif) de  $\text{sn}'$ . Remarquons que l'on a toujours  $|\text{sn}| \leq 1$  d'après, par exemple, la formule  $\text{sn}^2 + \text{cn}^2 = 1$ . Supposons que  $\text{sn}'$  ne s'annule pas sur  $\mathbf{R}_+$ , alors elle est de signe constant sur  $\mathbf{R}_+$  et  $y$  est donc positive puisque  $\text{sn}'(0) = 1$ . La fonction  $\text{sn}$  est donc strictement croissante de  $\mathbf{R}_+$  dans lui-même et définit donc un  $C^1$  difféomorphisme de  $\mathbf{R}_+$  sur son image.

Posons  $K' = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}$ . Remarquons que  $K'$  est bien défini puisque l'intégrande est continu sur  $[0; 1[$  et est équivalent à  $1/\sqrt{2(1-k^2)(1-t)}$  quant  $t$  tend vers 1 par valeurs inférieures. On peut donc écrire

$$u = \int_0^u dx = \int_0^{\text{sn}(u)} \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} \leq \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} = K'.$$

Ceci est impossible à satisfaire pour tout  $u$  réel positif. Donc  $\text{sn}'$  s'annule en au moins un point de  $\mathbf{R}_+$ . Comme elle  $y$  est continue, l'ensemble de ses zéros positifs est fermé et on peut donc définir  $K$  le plus petit de ses zéros positifs. Comme  $\text{sn}'$  est de signe constant sur  $[0; K]$ , elle  $y$  est positive, donc  $\text{sn}$   $y$  est croissante. En particulier  $\text{sn}$  est positive sur  $[0; K]$ . Comme  $\text{sn}'(K) = 0$ , on a  $\text{cn}(K) = 0$  et donc  $|\text{sn}(K)| = 1$ . Par positivité, on a donc  $\text{sn}(K) = 1$ . Par conséquent  $\text{sn}$  est un  $C^1$  difféomorphisme de  $[0; K]$  sur  $[0; 1]$ . On a donc

$$K = \int_0^u dx = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} = K'.$$