

Exercice 1 *Les équations de degré 4 vues par Euler*

1. Considérons une équation de degré 4 à coefficients symétriques

$$x^4 + 5x^3 + 8x^2 + 5x + 1 = 0 .$$

Décomposer le polynôme sous la forme $(x^2 + rx + 1)(x^2 + sx + 1)$ et trouver les quatre solutions.

2. Retrouver ce résultat en divisant l'expression par x^2 et en introduisant la variable $u = x + x^{-1}$.
3. Résoudre l'équation générale $x^4 + Bx^2 + Cx + D = 0$ en comparant les coefficients dans l'écriture

$$x^4 + Bx^2 + Cx + D = (x^2 + ux + \alpha)(x^2 - ux + \beta) .$$

On obtiendra une équation de degré 3 en u et on supposera que u y satisfait sans chercher à l'expliciter.

Exercice 2 *Euclide en langage moderne*

1. On se donne quatre grandeurs A, B, C et D . On dit que A est à B comme C est à D si, pour tout couple (m, n) d'entiers naturels non nuls, on a

$$\begin{aligned} nA > mB & \text{ implique } nC > mD \\ nA = mB & \text{ implique } nC = mD \\ nA < mB & \text{ implique } nC < mD \end{aligned}$$

- (a) Montrer que, si A est à B comme C est à D , alors A est à C comme B est à D .
 - (b) Montrer qu'également A est à B comme $A + C$ est à $B + D$.
2. On dit que deux grandeurs A et B sont commensurables s'il existe une autre grandeur C et deux entiers naturels n et m tels que A soit à B comme nC est à mC .
 - (a) Montrer que deux grandeurs sont commensurables si et seulement si l'algorithme d'anthyphèrese s'arrête, i.e. si en enlevant tour à tour la plus petite des deux grandeurs à la plus grande, on aboutit à deux grandeurs égales. Exemple : 8 et 5 donnent successivement (8,5), puis (3,5), puis (3,2) puis (1,2) et enfin (1,1).
 - (b) Montrer que deux nombres entiers sont toujours commensurables. A quoi sert alors cet algorithme quand on l'applique à de nombres entiers ?
 - (c) Connaissez-vous un nom associé à la suite (1, 1, 2, 3, 5, 8) ? Quel est son terme suivant ?
 - (d) Montrer que l'algorithme d'anthyphèrese appliqué à deux nombres à un seul chiffre est le plus long possible lorsque, justement, on part de 5 et 8.
 3. On dit A mesure B si A est à 1 comme B est à un certain entier naturel n .
 - (a) On dit qu'un nombre B est premier s'il n'est mesuré que par 1 et lui-même. Montrer que tout nombre est soit premier, soit mesuré par un nombre premier.
 - (b) Montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers.