

**Exercice 1** *Un peu de pratique ...*

- Grâce à un changement de variable, intégrer (i.e. trouver les solutions)  $y' = (8x + 2y + 1)^2$ .
- Intégrer les équations différentielles suivantes :
  - $y' - \frac{y}{x} = x$ ,
  - $y' + \frac{2y}{x} = x^3$ ,
  - $y' = 2xy + y^3$ ,
  - $y' + y \cos(x) = \sin(x) \cos(x)$ .
- Résoudre en tenant compte des conditions initiales :
  - $xy' + y - e^x = 0$  avec  $y(a) = b$ ,
  - $y' - y \tan(x) = \frac{1}{\cos(x)}$  avec  $y(0) = 0$ ,
  - $y' + y = \cos(x)$  avec  $y(0) = 1/2$ ,
  - $y' - 2y + x^2 = 0$  avec  $y(0) = 1/4$ .

**Exercice 2** *Équation du second ordre*

Trouver une solution particulière de l'équation  $y'' - 2y' + y = e^x \cos(x)$  de trois façons différentes :

- En cherchant  $y$  sous la forme  $y(x) = Ae^x \sin(x) + Be^x \cos(x)$  ;
- En utilisant la méthode de variation de la constante ;
- En résolvant  $y'' - 2y' + y = e^{(1+i)x}$ .

**Exercice 3** *Un peu de pratique ... (suite)*

- Résoudre en tenant compte des conditions initiales :
  - $y'' - 5y' + 4y = 0$  avec  $y(0) = 5$  et  $y'(0) = 8$ ,
  - $y'' + \pi^2 y = 0$  avec  $y(0) = y(1) = 0$ ,
  - $y'' - 2y' = e^{2x} + x^2 - 1$  avec  $y(0) = 1/8$  et  $y'(0) = 1$ .
- Intégrer  $yy'' = y'^2$ ,  $2y'' - y' - y = 4xe^{2x}$ ,  $y'' - 2y' + y = xe^x$ ,  $y'' + y = x \sin(x)$ .
- Intégrer  $y'' - 2y' + y = \sin(x) + \sinh(x)$ ,  $y'' + y = 2x \cos(x) \cos(2x)$ ,  $y^{(3)} + y'' + y' + y = xe^x$ .

**Exercice 4** *Fonctions de  $y/x$* 

- Montrer qu'une équation  $y' = g(y/x)$  peut s'intégrer grâce à la substitution  $v(x) = y(x)/x$ .
- Utiliser cette méthode pour résoudre  $y' = \frac{9x + 2y}{2x + y}$ .
- Intégrer  $4x^2 + 3xy + y^2 + (4y^2 + 3xy + x^2)y' = 0$ .
- Intégrer  $1 - 3x - 3y - (1 + x + y)y' = 0$ .

**Exercice 5** *Tractrice*

La tractrice est une courbe pour laquelle la distance, le long de la tangente, entre le point de contact de la tangente et l'axe des abscisses est constante égale à  $a$  (un réel strictement positif).

- Montrer que (ou rappeler pourquoi) cette courbe vérifie l'équation différentielle  $\sqrt{a^2 - y^2} y' = -y$ .
- Montrer que cette équation à variables séparables peut s'intégrer en posant  $y = a \cos(t)$  et en la ramenant à une fraction rationnelle grâce aux formules de l'angle moitié.
- Intégrer directement en posant  $v^2 = a^2 - y^2$ .

**Exercice 6** *Hyperboles*

Déterminer la courbe qui passe par le point  $(3; 2)$  et dont toute tangente coupe les axes de coordonnées en deux points dont le milieu est le point de tangence.

1. Grâce au théorème de Thalès, montrer que, si  $(x, y)$  est un point de tangence, alors la tangente coupe les axes de coordonnées en  $(2x, 0)$  et  $(0; 2y)$ , puis que la tangente admet  $-y/x$  pour pente.
2. Intégrer l'équation différentielle  $y' = -y/x$  et conclure.

**Exercice 7** *Wronskien (\*)*

Pour une équation différentielle linéaire (à coefficients non constants) du second ordre  $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$ , et pour deux solutions  $y_1$  et  $y_2$  de cette équation, on note  $w(x)$  le déterminant des deux vecteurs  $(y_1(x), y_1'(x))$  et  $(y_2(x), y_2'(x))$ .

1. Donner l'expression explicite de  $w(x)$ .
2. Montrer que  $w$  satisfait à une certaine équation différentielle linéaire du premier ordre.
3. En déduire  $w(x) = w(x_0) \exp\left(-\int_{x_0}^x a(t)dt\right)$  pour tout  $(x_0, x)$  dans l'intervalle d'étude.
4. En déduire que  $w$  est toujours nul ou jamais nul sur l'intervalle d'étude.