

Exercice 1 *Matrices*

1. Étant donné une matrice carrée $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ à coefficients dans \mathbf{K} , on appelle trace de A le scalaire $\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$, somme des éléments diagonaux. Montrer qu'on a $\text{Tr}(A+B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$ et $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$, lorsque A et B sont de même dimension.
2. Soit A une matrice carrée, montrer que A est inversible si et seulement s'il n'existe pas de vecteur colonne X non nul tel que $AX = 0$.
3. Montrer que si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et si, pour tout $1 \leq i \leq n$, on a $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, alors A est inversible.

Exercice 2 *Espaces vectoriels*

1. Dans l'espace \mathbf{R}^4 , on donne les vecteurs $x_1 = (1, 1, 2, 1)$, $x_2 = (1, -1, 0, 1)$, $x_3 = (0, 0, -1, 1)$, $x_4 = (1, 2, 2, 0)$ et $x = (1, 1, 1, 1)$.
 - (a) Montrer que les quatre vecteurs $(x_i)_{1 \leq i \leq 4}$ forment une base de \mathbf{R}^4 .
 - (b) Déterminer les coordonnées de x dans la base $(x_i)_{1 \leq i \leq 4}$.
2. Dans un espace vectoriel E sur le corps des complexes, on donne trois éléments a, b et c et on pose $u = b + c$, $v = c + a$ et $w = a + b$.
 - (a) Montrer que les sous-espaces vectoriels engendrés par a, b et c d'une part et u, v et w de l'autre sont identiques.
 - (b) Montrer que les vecteurs u, v et w sont indépendants (i.e forment une famille libre) si et seulement si a, b et c le sont.
3. On se place dans l'espace vectoriel E des fonctions continues de $[0; 1]$ dans \mathbf{R} . Soit F l'ensemble des fonctions dont l'intégrale est nulle.
 - (a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
 - (b) En donner un supplémentaire.
4. On se place dans l'espace vectoriel E_n des polynômes à coefficients réels de degré inférieur à n . Soit A un polynôme non constant, dans E_n .
 - (a) Montrer que l'ensemble F des polynômes de E_n divisibles par A , i.e. de la forme AB pour un certain B dans E_n , est un sous-espace vectoriel de E_n .
 - (b) En déterminer un supplémentaire et donner la dimension de F .
 - (c) On note $U_0 = 1$ et, pour $1 \leq k \leq n$, $U_k(X) = X(X - 1) \cdots (X - k + 1)$. Montrer que les polynômes U_k forment une base de E_n .

Exercice 3 *Fonctions trigonométriques*

1. Montrer que les familles de fonctions f_n et g_n de \mathbf{R} dans \mathbf{R} définies par $f_n(t) = \sin^n(t)$ et $g_n(t) = \sin(nt)$ sont libres dans $C^0(\mathbf{R}, \mathbf{R})$.
2. Soit E_n l'ensemble des polynômes trigonométriques de degré inférieur à n , i.e. des fonctions de la forme $x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt))$ avec des coefficients a_i et b_j réels. Montrer que E_n est un espace vectoriel.
3. Montrer, en utilisant des résultats sur les équations différentielles, que si x est la fonction nulle, alors tous les coefficients a_i et b_j sont nuls.
4. Donner la dimension de E_n ainsi qu'une base.

Exercice 4 *Corps des complexes (*)*

On se place dans l'espace vectoriel E des matrices 2×2 à coefficients réels, i.e. $E = \mathcal{M}_{2,2}(\mathbf{R})$.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans E , calculer A^2 et montrer qu'il existe des réels α et β tels que $A^2 = \alpha A + \beta I_2$.
2. Dans quel cas ces coefficients α et β ne sont pas uniques ?
3. On note F le sous-espace vectoriel engendré par A et I_2 . Quelle est sa dimension ?
4. Montrer que si B appartient à F et est inversible, son inverse appartient à F .
5. Déterminer quand F admet une structure de corps.
6. Lorsque $a = d = 0$ et $b = -c = 1$, montrer que ce corps est isomorphe au corps des complexes.

Exercice 5 *Exponentielle et logarithme (*)*

Toutes les matrices considérées sont carrées d'ordre n et à coefficients complexes. On dit qu'une matrice A est nilpotente s'il existe un entier $r \geq 1$ tel que $A^r = 0$, et unipotente si la matrice $I_n - A$ est nilpotente.

1. Lorsque N est nilpotente, on pose $\exp(N) = I_n + \frac{N}{1!} + \frac{N^2}{2!} + \dots + \frac{N^r}{r!} + \dots$. Vérifier que $N = \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente (ici a, b et c sont des scalaires quelconques) et calculer $\exp(N)$.
2. Lorsque U est unipotente, on pose $\log(U) = -\frac{I_n - U}{1} - \frac{(I_n - U)^2}{2} - \dots - \frac{(I_n - U)^r}{r} + \dots$. Vérifier que $U = \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est unipotente (ici x, y et z sont des scalaires quelconques) et calculer $\log(U)$.
3. Montrer qu'on a $\exp(\log(U)) = U$ et $\log(\exp(N)) = N$.
4. A quelle condition N et N' , nilpotentes de la forme donnée en 1., commutent-elles (i.e. $NN' = N'N$) ? Vérifier qu'alors $\log(NN') = \log(N) + \log(N')$.
5. A quelle condition U et U' , unipotentes de la forme donnée en 2., commutent-elles ? Vérifier qu'alors $\exp(U + U') = \exp(U)\exp(U')$.
6. Pour N nilpotente, donner une définition plausible de $\cos(N)$ et $\sin(N)$. Montrer qu'alors, lorsque N et N' commutent et sont comme en 1., on a $\cos(N + N') = \cos(N)\cos(N') - \sin(N)\sin(N')$, $\sin(N + N') = \sin(N)\cos(N') + \sin(N')\cos(N)$ et $\cos^2(N) + \sin^2(N) = I_n$.
7. Pour tout t complexe, on pose $U(t) = \begin{pmatrix} 1 & t & 2t + 2t^2 & 3t + \frac{17}{2}t^2 + 4t^3 \\ 0 & 1 & 4t & 5t + 12t^2 + 3t^4 \\ 0 & 0 & 1 & 6t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer qu'on a $U(t + s) = U(t)U(s)$ puis exhiber une matrice nilpotente N telle que $U(t) = \exp(tN)$.