

Exercice 1 *Combinatoire*

En général n désigne un entier naturel.

1. En considérant $(1 - 1)^n$, calculer $P_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$ et $I_n = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$.
2. Calculer $S_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{n-k}$ pour de petites valeurs de n . Démontrer par récurrence $S_{n+2} = 4(S_{n+1} - S_n)$.
3. Démontrer, pour $p \leq n$, $\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$. En déduire $\sum_{k=0}^n k^3$.
4. Pour n et p entiers, on définit une quantité $K(n, p)$ par : $K(n, 0) = 1$, $K(0, p) = 1$ et $K(n+1, p+1) = K(n+1, p) + K(n, p+1)$. Montrer $K(n, p) = \binom{n+p}{n} = \binom{n+p}{p}$.
5. Soit $a, b \in \mathbf{R}$. Calculer $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \binom{j}{i} a^i b^j$.
6. Calculer $S = \sum_{k=0}^n \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} \binom{i}{k}$.

Exercice 2 *Exponentielle et logarithmes*

1. Résoudre $\ln|x+1| - \ln|2x+1| \leq \ln 2$.
2. Pour $a \in \mathbf{R}_+^*$ et $a \neq 1$, résoudre l'inéquation $\ln_a(x) < \ln_{a^3}(3x-2)$.
3. Démontrer, pour x dans \mathbf{R}_+^* , $\ln(x) \leq x-1$ puis, en considérant $1/x$, $\frac{x-1}{x} \leq \ln(x) \leq x-1$.
4. En utilisant la question précédente, comparer π^e et e^π .
5. Soit $(a, b) \in \mathbf{R}^2$ et $1 < a \leq b$. Montrer $b^{a-1} \leq a^{b-1}$.
6. Résoudre $\log_x(10) + 2 \log_{10x}(10) + 3 \log_{100x}(10) = 0$.

Exercice 3 *Fonctions trigonométriques*

1. Calculer $\cos(\pi/9) \cos(2\pi/9) \cos(4\pi/9)$.
2. Montrer $\sin(\pi/10) \cos(\pi/5) = 1/4$.
3. Montrer $\frac{\cos(\pi/12) + \sin(\pi/12)}{\cos(\pi/12) - \sin(\pi/12)} = \sqrt{3}$.
4. Si α, β et γ sont les trois angles au sommet d'un triangle, montrer $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\gamma)$ et $\sin(2\alpha) + \sin(2\beta) + \sin(2\gamma) = 4 \sin(\alpha) \sin(\beta) \sin(\gamma)$.
5. Montrer que, pour tout x réel, on a $\sin(x) + \sin(x + \frac{2\pi}{3}) + \sin(x + \frac{4\pi}{3}) = 0$.
6. Montrer que, pour tout x réel, on a $\sin(x) + 2 \sin(3x) + \sin(5x) = 4 \cos^2(x) \sin(3x)$.
7. Montrer $\forall x \in \mathbf{R}^*$, $\arctan(x) + \arctan(\frac{1}{x}) = \operatorname{sgn}(x) \frac{\pi}{2}$.
8. Montrer, pour x et y réels vérifiant $|\arctan(x) + \arctan(y)| \leq \frac{\pi}{2}$, l'assertion $\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan(\frac{x+y}{1-xy})$. Que dire dans les autres cas ?
9. Résoudre l'équation en x réel, $\arctan(x) - \arctan(\frac{x}{3}) = \arccos(\frac{x}{2})$.

Exercice 4 Moyennes (*)

Soit (x_1, \dots, x_n) des réels strictement positifs. Pour $k \in \mathbf{R}^*$, on note f_k la fonction de \mathbf{R}_+^* dans lui-même qui à x associe x^k et $f_0 = \ln$ (de \mathbf{R}_+^* dans \mathbf{R}). Ce sont des bijections et on définit la moyenne d'ordre k de (x_1, \dots, x_n) par la formule :

$$M_k(x_1, \dots, x_n) = f_k^{-1} \left(\frac{f_k(x_1) + \dots + f_k(x_n)}{n} \right).$$

1. Montrer que toutes ces formules ont un sens et qu'on a $M_0(x_1, \dots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 \dots x_n}$. On parle de moyennes géométrique ($k = 0$), arithmétique ($k = 1$), quadratique ($k = 2$) ou encore harmonique ($k = -1$).
2. On suppose $n = 2$, montrer $M_0 \leq M_1$.
3. En déduire que, pour n une puissance de 2, on a encore $M_0 \leq M_1$.
4. Montrer, en notant $\mu = M_k(x_1, \dots, x_n)$, qu'on a $\mu = M_k(x_1, \dots, x_n, \mu, \mu, \dots, \mu)$ où le nombre de μ est arbitraire.
5. En déduire qu'en toute généralité $M_0 \leq M_1$, i.e. la moyenne géométrique de tout n -uplet de réels strictement positifs est toujours inférieure à leur moyenne arithmétique. On pourra comparer $M_0(x_1, \dots, x_n, \mu, \mu, \dots, \mu)$ et $M_1(x_1, \dots, x_n, \mu, \mu, \dots, \mu)$ pour $\mu = M_1(x_1, \dots, x_n)$.
6. En déduire $M_{-1} \leq M_0$ et donc $M_{-1} \leq M_0 \leq M_1$.
7. Reprendre l'étude et montrer que le seul cas d'égalité (en dehors de $n = 1$) est obtenu lorsque tous les réels considérés sont égaux.
8. Quel est la valeur minimum de la quantité $(\sum_{i=1}^n x_i) (\sum_{i=1}^n x_i^{-1})$ pour les x_i variant dans \mathbf{R}_+^* ?
9. Montrer $1 + x \leq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq \frac{1}{1-x}$ (on précisera le domaine de validité de chacune de ces deux inégalités). Quelle est la limite de cette inégalité (pour n tendant vers $+\infty$) ?