

Sauf précision contraire, on désigne par $(u_n), (v_n)$ etc. des suites réelles. L'utilisation du symbole \lim indique que l'on suppose (ou que l'on demande de démontrer) la convergence de la suite considérée.

Exercice 1 *Suites - Études générales*

1. Montrer qu'une suite à valeurs entières converge si et seulement si elle est stationnaire.
2. On suppose $\lim u_n < \lim v_n$. Montrer $u_n < v_n$ à partir d'un certain rang.
3. Soit (u_n) et (v_n) deux suites convergentes. Étudier $\max((u_n), (v_n))$ et $\min((u_n), (v_n))$.
4. Soit (u_n) une suite bornée. Étudier la monotonie de $v_n = \sup_{p \geq n} u_p$ et $w_n = \inf_{p \geq n} u_p$.
5. On suppose qu'on n'a pas $\lim u_n = +\infty$. Montrer que l'on peut extraire de (u_n) une suite bornée.
6. On suppose $(u_n + v_n)$ et $(u_n - v_n)$ convergentes. Montrer que (u_n) et (v_n) convergent.
7. Soit (u_n) une suite complexe telle que (u_n^2) et (u_n^3) convergent. Montrer que (u_n) converge. L'hypothèse " (u_n^2) converge" est-elle suffisante pour conclure que (u_n) converge ?
8. On suppose $0 \leq (u_n) \leq 1, 0 \leq (v_n) \leq 1$ et $u_n v_n \rightarrow 1$. Que dire de ces suites ?
9. On suppose $u_n^2 + u_n v_n + v_n^2 \rightarrow 0$. Démontrer que (u_n) et (v_n) convergent vers 0.
10. Soit (a_n) et (b_n) à termes strictement positifs telles qu'à partir d'un certain rang $a_{n+1}/a_n \leq b_{n+1}/b_n$. Démontrer que si b_n tend vers 0, alors a_n aussi et que si a_n diverge vers $+\infty$, b_n aussi.
11. Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite réelle à termes strictement positifs, telle que $(\sqrt[n]{u_n})_{n \in \mathbf{N}}$ converge vers un réel ℓ . Montrer que, si $\ell < 1$, alors $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge vers 0. Que peut-on dire si $\ell > 1, \ell = 1$?

Exercice 2 *Études de suites*

1. Soit (u_n) une suite telle qu'il existe $k > 1$ tel que $u_{n+1} \geq k u_n$ et telle que $u_0 > 0$, étudier sa limite.
2. Soit (u_n) une suite telle que $\exists k < 1, |u_{n+1}| \leq k |u_n|$ à partir d'un certain rang ; étudier sa limite.
3. Trouver la limite de $\sqrt[n]{n^3 + 1}$.
4. Soit $(u_n) = \left(\frac{3n-1}{2n+3}\right)$. Montrer que (u_n) est croissante et majorée, puis qu'elle converge vers $3/2$.
5. Soit a et b deux réels strictement positifs, on pose $(u_n) = \left(\frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}\right)$. Étudier (u_n) .
6. On suppose $\forall (k, n) \in (\mathbf{N}^*)^2, 0 \leq u_n \leq \frac{k}{n} + \frac{1}{k}$. Déterminer $\lim u_n$.
7. On suppose $\forall (p, n) \in (\mathbf{N}^*)^2, 0 \leq u_{n+p} \leq \frac{n+p}{np}$. Montrer $\lim u_n = 0$.
8. On suppose $\forall (n, p) \in (\mathbf{N}^*)^2, |u_n + u_p - u_{n+p}| \leq \frac{1}{n+p}$. Montrer que (u_n) est une suite arithmétique.
9. Soit (u_n) une suite croissante. On suppose que la suite (v_n) , formée des moyennes arithmétiques des $(n + 1)$ premiers termes, a même limite que (u_n) .
10. Étudier la limite de la suite définie par $u_0 > 0$ et, pour $n \in \mathbf{N}, u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$.
11. Soit (u_n) une suite réelle telle que $\frac{u_n}{1+u_n} \rightarrow 0$. Montrer que (u_n) converge vers 0.
12. Étude de (u_n) définie par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n + u_n^2$.
13. Soit (u_n) bornée avec $\forall n \in \mathbf{N}^*, u_n \leq \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_{n-1})$. Montrer que (u_n) converge.
14. Soit $\alpha > 1$. Étudier (x_n) définie par $x_0 > \sqrt{\alpha}$ et $x_{n+1} = x_n + \frac{\alpha - x_n^2}{1 + x_n}$. On étudiera (x_{2n}) et (x_{2n+1}) .
15. Convergence de $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2}$.
16. Soit $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}}$. Prouver que (u_n) converge et donner sa limite.
17. Soit (u_n) une suite convergente. On suppose que la suite s_n donnée par $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$ converge vers un réel S . On pose $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k u_k$. Étudier $\lim v_n$.

Exercice 3 *Approximations de réels*

1. Soit a et b deux réels tels que $a < b$ et x dans $[a; b]$. Démontrer que, pour tout entier n , il existe un unique entier k_n vérifiant $0 \leq k_n \leq 2^n$ et $a + k_n \frac{b-a}{2^n} \leq x < a + (k_n + 1) \frac{b-a}{2^n}$. En déduire que x est limite d'une suite (u_n) d'éléments de la forme $u_n = a + k_n \frac{b-a}{2^n}$ avec $0 \leq k_n \leq 2^n$.
2. Soit x un réel dans $[0; 1[$. On pose $f_1 = x$ et $a_1 = E(10f_1)$. Pour $n \geq 1$, on pose $f_{n+1} = 10f_n - a_n$ et $a_{n+1} = E(10f_{n+1})$. Enfin on pose $x_n = \sum_{k=1}^n a_k 10^{-k}$. Montrer que, pour tout entier n dans \mathbf{N}^* , on a $0 \leq x - x_n = f_{n+1} 10^{-n} < 10^{-n}$ et en déduire $\lim x_n = x$.
3. Soit x un réel. Montrer qu'il existe n_0 dans \mathbf{N} et $(a_n)_{n \geq -n_0} \in \{0, 1, \dots, 9\}^{\mathbf{N}}$ tel que, en posant $x_n = \sum_{k=-n_0}^n a_k 10^{-k}$, on ait : $x = \lim x_n$ et $\forall n \in \mathbf{N}, \exists m > n, a_m \neq 9$.
4. Montrer que l'écriture précédente est unique. On l'appelle développement décimal illimité de x .
5. Montrer que le développement décimal illimité est fini (i.e. (a_n) est presque nulle) si et seulement si x est un rationnel de la forme p/q avec $q = 2^a 5^b$ (avec a et b entiers naturels) et qu'il y a alors $\max(a, b)$ chiffres après la virgule.
6. Montrer que le développement décimal est purement périodique, (i.e. $(a_n)_{n \geq 1}$ est périodique) si et seulement si x est rationnel de la forme p/q avec $\text{pgcd}(q, 10) = 1$.
7. Montrer que x est rationnel si et seulement si son développement décimal illimité est périodique (i.e. il existe n_1 un entier naturel tel que $(a_n)_{n \geq n_1}$ est périodique).
8. En déduire que $0,010010001 \dots, 0,2357111317 \dots$ et $0,01001000010000001 \dots$ sont irrationnels.

Exercice 4 *Suites homographiques*

1. Soit la suite définie par $u_{n+1} = \frac{au_n+b}{cu_n+d}$ avec $(a, b, c, d) \in \mathbf{C}^4$. Donner les u_0 pour lesquels la suite est bien définie (on ne cherchera pas une description explicite).
2. Montrer qu'il est équivalent de dire que $(u_{n+1}, 1)$ est un vecteur directeur de la droite image de la droite engendrée par $(u_n, 1)$ par l'application linéaire représentée par la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
3. Montrer qu'en général il existe deux complexes α tels que $\det(A - \alpha I_2) = 0$.
4. Dans ce cas, on les note α_1 et α_2 et on note z_1 et z_2 les complexes tels que $(z_i, 1) \in \text{Ker}(A - \alpha_i I_2)$. Montrer $(az_i + b)/(cz_i + d) = z_i$.
5. Étudier la suite $v_n = (u_n - \alpha_1)/(u_n - \alpha_2)$ et en déduire le comportement de la suite (u_n) .
6. Étudier les cas particuliers de l'exercice précédent.

Exercice 5 *Points d'accumulation (*)*

Soit (u_n) une suite réelle. On dit qu'un réel a est un point d'accumulation de (u_n) s'il en existe une sous-suite tendant vers a .

1. Montrer que toute suite bornée admet un point d'accumulation.
2. On suppose (u_n) bornée. Montrer que $v_n = \sup\{u_k \mid k \geq n\}$ définit une suite décroissante minorée et que $\lim v_n$ est le plus grand point d'accumulation de (u_n) . On le note $\overline{\lim} u_n$.
3. On suppose (u_n) bornée. Montrer que $w_n = \inf\{u_k \mid k \geq n\}$ définit une suite croissante majorée et que $\lim w_n$ est le plus petit point d'accumulation de (u_n) . On le note $\underline{\lim} u_n$.
4. Dans le cas général, montrer qu'on peut définir $\overline{\lim} u_n$ et $\underline{\lim} u_n$ comme des éléments de $\overline{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.
5. Soit $\ell \in \mathbf{R}$. Montrer $u_n \rightarrow \ell \Leftrightarrow \overline{\lim} u_n = \underline{\lim} u_n = \ell$.
6. Montrer $u_n \rightarrow +\infty$ (resp. $-\infty$) $\Leftrightarrow \underline{\lim} u_n = +\infty$ (resp. $\overline{\lim} u_n = -\infty$).
7. Montrer que u_n converge si et seulement si elle est bornée et admet un unique point d'accumulation. Montrer qu'alors ce point d'accumulation est sa limite.