

Exercice 1 Géométrie

Soit A le point d'affixe 1. Pour tout complexe z , on note M_1, M_2 et M_3 les points d'affixe z, z^2 et z^3 .

1. Déterminer l'ensemble des points M_1 tels que A, M_1 et M_3 soient alignés.
2. Déterminer l'ensemble des points M_1 tels que A, M_1 et M_2 soient alignés.
3. Déterminer l'ensemble des points M_1 tels que A, M_2 et M_3 soient alignés.
4. Déterminer l'ensemble des points M_1 tels que A, M_1 et M_2 forment un triangle rectangle.

Exercice 2 Trigonométrie

1. Résoudre dans \mathbf{R} l'équation d'inconnue $x : \sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) + \sin(4x) = 0$.
2. Résoudre dans \mathbf{R} l'équation d'inconnue $x : \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) + \cos(4x) = 0$.
3. Soit $n \in \mathbf{N}^*$. On pose $\omega = \exp(2i\pi/n)$. Exprimer à l'aide de ω une factorisation du polynôme $X^n - 1$.
4. Soit a et b deux nombres complexes. Établir l'égalité $\prod_{k=0}^{n-1} (a - b\omega^k) = a^n - b^n$.
5. Résoudre l'équation $x^2 - 2x \cos(\theta) + 1 = 0$ et en déduire une factorisation du polynôme $x^2 - 2x \cos(\theta) + 1$.
6. Établir alors l'égalité $\prod_{k=0}^{n-1} (\omega^{2k} - 2\omega^k \cos(\theta) + 1) = 2(1 - \cos(n\theta))$.

Exercice 3 Géométrie (bis)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé on considère les points $A(-i), B(1)$ et $C(i)$. Pour z complexe distinct de $-i$, on pose $f(z) = \frac{z-i}{z+i}$ et F l'application du plan qui au point d'affixe z associe le point d'affixe $f(z)$.

1. Montrer que tout point du plan, excepté un point particulier que l'on précisera, est l'image par F d'un unique point. Trouver les points M tels que $F(M) = M$.
2. On pose $M' = F(M)$. Exprimer la distance BM' en fonction de la distance AM . Montrer que l'image par F du cercle de centre A et de rayon R est un cercle dont précisera les caractéristiques.
3. Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que $f(z)$ soit réel.
4. Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que $f(z)$ soit imaginaire pur.
5. Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que $f(z)$ soit de module 1.
6. Soit $n \geq 1$, déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que $f(z)$ soit une racine de l'unité.
7. Déterminer l'ensemble que décrit $F(M)$ lorsque M décrit la droite (AB) privée de A.

Exercice 4 Demi-plan de Poincaré

Soit \mathbf{H} le demi-plan défini par $\text{Im}(z) > 0$. Soit $u = a + ib$ et $v = c + id$ deux nombres complexes écrits sous forme algébrique. On note $s_{u,v}$ la transformation définie par $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ et j_v la fonction définie par $j_v(z) = |cz + d|^2$.

1. Soit a et b deux réels distincts, z_0 un élément de \mathbf{H} et R un réel strictement positif.

- (a) Donner une équation de la droite D_a passant par le point d'affixe a et orthogonale à l'axe des abscisses.
 - (b) Donner une équation du cercle $\Gamma_{a,b}$ de diamètre $[A, B]$ avec A et B les points d'affixes respectives a et b .
 - (c) Donner une équation du cercle de centre d'affixe z_0 et de rayon R et préciser quand ce cercle est entièrement inclus dans \mathbf{H} . Quand cette condition est vérifiée, on note $C_{\mathbf{H}}(z_0; R)$ ce cercle.
2. Soit u et v deux nombres complexes tels que $\det(u, v) = 1$.
- (a) Montrer que, pour tout complexe z non réel, $s_{u,v}(z)$ est bien défini et $j_v(z)$ est non nul, et qu'on a $\operatorname{Im}(s_{u,v}(z)) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{j_v(z)}$.
 - (b) Montrer que $s_{u,v}$ est une bijection de \mathbf{H} dans \mathbf{H} .
 - (c) Justifier que $\det(u, v) = 1$ et interpréter géométriquement $s_{u,v}$ dans les cas suivants : $(u, v) = (1 + ib, i)$, $(u, v) = (a, i/a)$ et $(u, v) = (i, -1)$.
 - (d) Montrer que $s_{u,v}$ est la composée d'applications d'un des trois types étudiés à la question précédente.
3. Avec les notations et des deux questions précédentes, quelle figure décrit $s_{u,v}(z)$ lorsque z décrit l'une des trois figures suivantes : D_a , $\Gamma_{a,b}$ ou $C_{\mathbf{H}}(z_0; R)$?

Exercice 5 Polygones réguliers à points entiers (*)

Soit n un entier supérieur ou égal à 3.

1. Rappeler quelles sont les affixes des sommets du polygone régulier à n côtés de centre O et dont l'un des sommets est d'affixe 1.
2. En utilisant une similitude, montrer que les affixes z des sommets d'un polygone régulier à n côtés, vérifient une équation du type $(z - \omega)^n = a^n$, avec ω et a des complexes, et $a \neq 0$. Dans la suite on note Π_n un tel polygone. Interpréter géométriquement ω .
3. Soit A et B deux sommets distincts de Π_n . Donner une équation de la médiatrice de $[A, B]$ en termes complexes, et en utilisant les affixes de A et B .
4. On suppose que trois des sommets de Π_n ont des affixes dont la partie réelle et la partie imaginaire sont des nombres entiers (relatifs). Montrer que ω a des parties réelles et imaginaires rationnelles.
5. On suppose de plus que, parmi les trois sommets précédents, deux sont consécutifs. Montrer que $e^{2i\pi/n}$ a des parties réelles et imaginaires rationnelles.
6. Soit θ un nombre réel.
 - (a) Montrer $\cos((n+1)\theta) = 2\cos(\theta)\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$.
 - (b) On pose $X = 2\cos(\theta)$. Montrer qu'on peut écrire $2\cos(n\theta)$ sous la forme $a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1} + X^n$, avec a_0, a_1, \dots, a_{n-1} des entiers naturels **indépendants** de θ .
 - (c) On note T_n l'expression polynomiale obtenue à la question précédente. Soit p et q sont deux entiers n'ayant aucun diviseur commun, avec $q \neq 0$. Montrer : $T_n\left(\frac{p}{q}\right) = 0 \Rightarrow q = 1$. En déduire que si r est un nombre rationnel tel que $T_n(r) = 0$, alors r est un entier relatif.
7. En déduire $n = 4$ et donc que Π_n est un carré dont **tous** les sommets ont des affixes dont les parties réelle et imaginaires sont entières.